

23/04/04



Информация за пациента

Моля прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечението. Тя съдържа важна информация за вашето лекарство и не бива да я изхвърляте, тъй като по-късно може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси или не сте сигурни в нещо, моля обърнете се към Вашия лекар.

Наименование

CEFZIL ®

Цефзил

cefprozil

Какво съдържа Вашето лекарство?

Всяка таблетка **Cefzil®** съдържа като лекарствено вещество 250 mg или 500 mg cefprozil като cefprozil monohydrate.

Cefzil® перорална суспенсия съдържа като лекарствено вещество 125mg или 250 mg cefprozil като cefprozil monohydrate на 5 ml от разтворената суспенсия.

Как се предлага Вашето лекарство?

Cefzil® се предлага под формата на филм таблети 250mg и 500 mg в блистери. **Cefzil®** суспенсия за перорално приложение 125mg/5ml и 250mg/5ml се предлага като прах в бутилки от полиетилен с висока плътност.

Производител

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Sermoneta (Latina), Italy

Какво представлява Cefzil®?

Cefzil® (cefprozil) е полусинтетичен широко спектърен цефалоспоринов антибиотик.

За какво се прилага това лекарство?

Cefzil® се прилага за лечение на пациенти със следните инфекции, причинени от чувствителни на cefprozil бактерии:

- Инфекции на горните дихателни пътища, включващи фарингити, тонзилити, синузити и отити;
- Инфекции на долните дихателни пътища, включващи остри и хронични бронхити, пневмонии;
- Инфекции на кожата и меките тъкани;
- Не усложнени инфекции на пикочните пътища, остри цистити.



Как се прилага това лекарство?

Ако лекарят не е предписал друго, да се спазва следната дозировка и начин на приложение:

Възрастни и деца над 12 години

Cefzil® се прилага перорално при лечение на инфекции, причинени от чувствителни на cefprozil бактерии в следните дози:

| | |
|------------------------|--|
| Пневмония и бронхит | 500 mg на 12 часа |
| Фарингити и тонзилити, | 500 mg на 24 часа |
| Синузити | 250 mg на 12 часа или 500 mg на 12 часа |

Инфекции на кожата и

меките тъкани 500 mg на 24 часа

Неусложнени инфекции на

пикочните пътища 500 mg на 24 часа

Деца

Cefzil® се използва при деца на възраст между 6 месеца и 12 години.

Прилага се перорално за лечение на инфекции, причинени от чувствителни на cefprozil бактерии в следните дози:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Отити | 15-20 mg/kg на 12 часа |
| Фарингити и тонзилити | 20 mg/kg на 24 часа |
| Синузити | 7,5-15 mg/kg на 12 часа |
| Инфекции на кожата и меките тъкани | 20 mg/kg на 24 часа |

Максималната детска дневна доза не трябва да надвишава препоръчваната доза при възрастни. При лечение на β -хемолитични стрептококови инфекции, терапевтични дози на Cefzil се прилагат за 10 дни.

Безопасността и ефективността при деца под 6 месеца не е установена.

Кога не трябва да приемате Cefzil?

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Cefzil е противопоказан при болни с алергия към цефалоспорини.

Какви специални предпазни мерки трябва да съблюдавате?

Преди да започнете да взимате Cefzil:

- Уведомете Вашия лекар ако сте алергични към Cefzil, цефалоспорини, пеницилини или други лекарства.
- Уведомете Вашия лекар ако взимате други лекарства (с рецептa или без рецептa) и по-специално други антибиотици, антикоагуланти и витамини.
- Уведомете Вашия лекар ако имате или сте имали бъбречно или чернодробно заболяване, колит или стомашни проблеми.



- Уведомете Вашия лекар ако сте бременна или планирате бременност, или ако кърмите.
- Ако Ви предстои операция, включително и стоматологична, уведомете лекаря, че взимате cefprozil.

Цефалоспорините, включително и Cefzil, трябва да се дават с внимание при болни, получаващи едновременно и диуретици, тъй като те допълнително засягат бъбречната функция.

Фенилкетонурици: Cefzil суспенсия за перорално приложение съдържа фенилаланин 28 mg на 5 ml (1 супена лъжица) суспенсия за 125 mg/5ml и 250 mg/5ml лекарствена форма.

Какви нежелани лекарствени реакции могат да настъпят по време на лечението с Cefzil?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при болни на терапия с Cefzil са:

- Стомашно-чревни , гадене , повръщане и болки в корема
- Жълчно-чернодробни
- Свръхчувствителност: обриви , уртикария . Тези реакции се наблюдават по-често при деца. Признаките и симптомите обикновено се наблюдават няколко часа след началото на терапията и постепенно стихват за няколко дни след прекъсване на лечението.
- ЦНС: световъртеж , хиперактивност, главоболие, нервност, безсъние и сънливост . Всички са обратими.
- Други: обриви и суперинфекция , генитален съrbеж и вагинит

Какво трябва да знаете в случай на предозиране?

В случай на свръхдозиране потърсете лекарска помощ.

Какви помощни вещества има Вашето лекарство?

Таблетки: целулоза, хидроксипропилметилцелулоза, магнезиев стеарат, метилцелулоза, симетикон, натриев нишестен гликолат, полиетиленгликол, полисорбат 80, сорбинова киселина и тиаминов диоксид.

Перорална суспенсия: аспартам, целулоза, лимонена киселина, колоидален силиконов диоксид, Sunset Yellow FCF, есенции (естествени и изкуствени), глицин, полисорбат 80, симетикон, натриев бензоат, натриев карбоксиметилцелулоза, натриев хлорид и захароза.

Как трябва да съхранявате лекарството?

Cefzil табл.: Да се съхранява под 30°C. Да се пази от влага.

Готовата суспенсия Cefzil е стабилна 14 дни, ако се съхранява в хладилник при 2-8° C . Неизползваното количество да се изхвърли след 14 дни.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, означен върху опаковката

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Дата на последна редакция:
2003 г.

