

## CHLOPHAZOLIN® tabl. 0,15 mg

## Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбираете нещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

CHLOPHAZOLIN®  
ХЛОФАЗОЛИН®  
Таблетки 0,15 mg

## КАКВО СЪДЪРЖА ХЛОФАЗОЛИН®?

Всяка таблетка съдържа лекарствено вещество clonidine hydrochloride 0,15 mg.

Помощни вещества: млечна захар, микрокристална целулоза, калциев хидрогенфосфат, колоидален силициев диоксид, пшенично нишесте, талк, магнезиев стеарат.

## ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

50 таблетки в блистер от прозрачно и алуминиево ПВХ фолио, по 1 блистер в картонена кутия заедно с листовка с указания за употреба.

## ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ

СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

## КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХЛОФАЗОЛИН®?

Хлофазолин® принадлежи към групата на антихипертензивните (понижаващи артериалното налягане) лекарства. Той понижава артериалното налягане, забавя сърдечната честота и премахва съпротивлението в периферните кръвоносни съдове.

## ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ХЛОФАЗОЛИН®?

Хлофазолин® таблетки се използва за лечение на хипертонична болест, самостоятелно или в комбинация с други средства.

## КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ХЛОФАЗОЛИН®?

Не трябва да използвате Хлофазолин® таблетки в следните случаи:

- Ако сте алергични към лекарственото или някое от помощните вещества;
- Ако имате сърдечно заболяване, което е свързано с нарушение на сърдечния ритъм и проводимост (атрио-вентрикуларен блок II-III степен, синдром на болния синусов възел);
- Остър миокарден инфаркт;
- Депресия.



**ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ХЛОФАЗОЛИН®**

*Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, ако сте серъхчувствителни към други лекарства или храни или ако вземате други лекарства.*

Уведомете Вашия лекар ако имате друго сърдечно заболяване като исхемична болест на сърцето, нарушения на мозъчното кръвообращение, бъбречно заболяване.

**Бременност и кърмене**

*Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете.*

*Преди да вземате някакво лекарство по време на бременност, непременно се посъветвайте с лекуващия си лекар.*

Ако сте бременна лечение с Хлофазолин® се провежда само под лекарски контрол.

Съобщете на лекуващия лекар ако кърмите, тъй като клонидин (лекарственото вещество на Хлофазолин®) преминава в кърмата.

**Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

При употреба на Хлофазолин® е възможна појава на сънливост, забавяне на реакциите. При необходимост от лечение с Хлофазолин® на водачи на превозни средства и оператори на машини се препоръчва да се избягват дейности, изискващи повишено внимание и бързина на реакциите.

**Информация за помощните вещества**

Поради наличието на пшенично нищесте в състава на таблетката, продуктът е неподходящ за хора с непоносимост към глутен (глутенова ентеропатия).

**КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОГАТ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С ХЛОФАЗОЛИН®?**

*Моля, уведомете лекуващия си лекар за ВСИЧКИ лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или сте ги купили без рецепт.*

*Това е важно, защото Хлофазолин® може да промени активността на някои лекарства или обратно някои лекарства да променят неговите ефекти.*

Уведомете лекуващия си лекар ако приемате:

- други лекарства за понижаване на артериалното налягане като диуретици, калциеви антагонисти (например верапамил), АСЕ-инхибитори (каптоприл); бета-блокери (пропранолол) или сърдечни гликозиди (дигоксин);
- лекарства за лечение на депресия или психози;
- антиревматични противовъзпалителни лекарства;
- сънотворни, успокояващи лекарства;
- лекарства за лечение на алергии.

Не употребявайте алкохол или лекарства, съдържащи алкохол по време на лечение с Хлофазолин®.

**ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

*Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар. Важно е да вземате лекарството така, както лекарят Ви го е предписал. Не трябва да променяте дозите или да преустановявате*



## CHLOPHAZOLIN® tabl. 0,15 mg

*лечението, без да се консултирате преди това с лекаря, дори ако се чувствате добре. Опитайте се да вземате лекарството по едно и също време всеки ден.*

**Начин на приложение:** таблетките се приемат през устата, с вода.

**Възрастни:** лечението започва с  $\frac{1}{2}$  таблетка (0,075 mg) 2-3 дневно. Дозата може да се повиши постепенно (през 2-3 дни) до 1 – 2 таблетки (0,15 – 0,30 mg) 2-3-пъти дневно. Не приемайте повече от 12 таблетки дневно!

**Дела:** Досега не е доказана ефективността и безопасността на продукта, поради което не се препоръчва употребата му в детска възраст.

*Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е много силен или твърде слаб, моля, консултирайте се с лекуващия си лекар.*

*Не прекъсвайте внезапно лечението с Хлофазолин®!*

Прекратяването на лечението става постепенно в продължение на няколко дни, след консултация с лекуващия Ви лекар.

**Ако вземете повече Хлофазолин® отколкото трябва**

Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, може да почувствате замаяност, сънливост, световъртеж, забавяне на сърденчния ритъм. Посъветвайте се незабавно с лекуващия си лекар или се обърнете за помощ в най-близкото здравно заведение.

**Ако сте пропуснали прием на Хлофазолин®**

Ако пропуснете да вземете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е настанало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както ви е предписано от лекуващия ви лекар.

#### НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

*Както всички лекарства, Хлофазолин® може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Вие можете да не получите никаква реакция.*

При лечение с Хлофазолин® са възможни следните нежелани реакции: сухота в устата, гадене, повръщане, главоболие, световъртеж, забавяне на сърденчния ритъм, треперене на крайниците, сънливост, сърбеж, обриви и зачервяване на кожата.

*Ако получите нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.*

#### СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Съхранявайте таблетките на сигурно място, където децата не могат да ги видят и достигнат.

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на годност, отбелязана върху опаковката.

#### НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

Тази листовка е редактирана за последен път на 25.10.2005

