

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЦИНАРИЗИН АКТАВИС 25mg таблетки
CINNARIZIN ACTAVIS 25mg tablets

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...05-19-08...

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ.

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт.
- Този продукт е лично за Вас и не бива да го давате на никой друг. Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Цинаризин Актавис и за какво се прилага?
2. Какво е необходимо да знаете преди да започнете приложението на Цинаризин Актавис.
3. Как се прилага Цинаризин Актавис?
4. Възможни нежелани реакции.
5. Условия на съхранение.
6. Допълнителна информация.

ЦИНАРИЗИН АКТАВИС 25 mg таблетки

Цинаризин

Лекарствено вещество в една таблетка: Цинаризин 25 mg

Помощни вещества: Лактоза монохидрат, пшеничено нишесте, повидон, силициев диоксид, колоиден безводен; магнезиев стеарат.

Опаковка

Цинаризин Актавис 25 mg се предлага по 50 и по 100 броя таблетки в опаковка

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" №29
1407, София България



ПРОИЗВОДИТЕЛ

Балканфарма-Дупница АД
ул. "Самоковско шосе" №3
2600, Дупница, България

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИНАРИЗИН АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Цинаризин е лекарствен продукт, който потиска процесите на транспорт на калциевите йони през клетъчните мембрани, особено в гладко-мускулните клетки на съдовете и по този механизъм води да тяхното разширяване. Намалява възбудимостта на центъра на равновесието. Повишава устойчивостта на клетките към липсата на кислород. Не оказва съществено влияние върху артериалното налягане и пулса.

Цинаризин Актавис се използва като поддържащо лечение при симптоми, свързани със заболявания и нарушения в равновесието, шум в ушите, неконтролирано трептене и движение на очните ябълки (нистагъм), гадене, повръщане, както и за профилактика на т.н. болест на пътуването.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ЦИНАРИЗИН АКТАВИС

Цинаризин Актавис не се прилага при:

- Алергия /свръхчувствителност/ към активното или някое от помощните вещества;
- Болест на Паркинсон;
- Чернодробна и бъбречна недостатъчност.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Необходимо е продуктът да се прилага с повишено внимание при пациенти с ниско кръвно налягане, закритоъгълна глаукома, задръжка на урината, някои кожни заболявания като лупус еритематодес и лихен рубер планус.

Поради това, че цинаризин се подлага на интензивна биотрансформация в черния дроб и впоследствие се елиминира от организма чрез бъбреците, продуктът се прилага с внимание при пациенти с чернодробни и бъбречни заболявания. При продължително лечение Вашият лекар ще определи какви лабораторни изследвания е необходимо да бъдат извършвани регулярно.



Приложение на Цинаризин Актавис и прием на храна и напитки
По време на лечението с продукта не трябва да се консумира алкохол.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Няма данни цинаризин да предизвиква увреждания или да има други неблагоприятни ефекти върху плода при животни.

Неговата безопасна употреба не е установена със сигурност при бременни, поради което по време на бременност лечение с продукта не се предприема.

При настъпване на бременност е необходимо да уведомите Вашия лекар, който ще прецени продължаването на лечението.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Няма данни цинаризин да предизвиква увреждания или да има други неблагоприятни ефекти върху новороденото при животни.

Неговата безопасна употреба не е установена със сигурност при кърмещи жени, поради което по време на кърмене лечение с продукта не се предприема или ако това е наложително, кърменето се преустановява за този период.

Шофиране и работа с машини

Прилагането на продукта при шофьори, лица работещи с машини или такива извършващи дейности, налагащи висока концентрация на вниманието и адекватна координация ще бъде прецизирано внимателно от Вашия лекар. Известно е, че в някои случаи особено в началото на лечението или при прилагането на високи дози може да предизвика сънливост, загуба на координация, обърканост.

Данни за помощните вещества

Лекарственият продукт съдържа пшенично нишесте и може да представлява опасност за хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия).

Лекарственият продукт съдържа лактоза, което го прави неподходящ при пациенти с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.



При едновременна употреба с цинаризин може да се усили действието на средствата потискащи нервната система, продуктите за лечение на депресия (трициклични антидепресанти) и на алкохола. При едновременна употреба цинаризин усилва ефектите на лекарствата за високо кръвно налягане (антихипертензивни средства).

Вазодилаторите засилват действието на продукта. При едновременно приложение с атропин и други антихолинергични продукти се наблюдава засилване на ефекта.

В резултат на своите специфични ефекти цинаризин може да промени резултатите от кожните тестове за доказване на алергия, поради което лечението с продукта трябва да се преустанови поне 4 дни преди провеждането на теста.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ЦИНАРИЗИН АКТАВИС ?

Винаги приемайте Цинаризин Актавис според инструкциите на лекуващия лекар!

Препоръчвани дневни дози за възрастни и деца над 16 години

Гадене, световъртеж, нарушения в координацията в резултат на заболявания на центъра на равновесие – 3 пъти дневно по 1 таблетка.

Профилактика на болест на пътуването - 1 таблетка 1/2 - 1 час преди пътуване и на всеки 6 часа по 1 таблетка.

Максимална допустима дневна доза 9 таблетки.

Таблетките се приемат след хранене.

Ако имате впечатлението, че ефектът на Цинаризин Актавис е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Ако сте приели по-голямо количество от лекарството:

При прием на по-висока доза от предписаната веднага се обърнете за съвет към лекар!

Приемането на по-голяма от препоръчаната доза може да доведе до предозиране, което да се прояви с повръщане, сънливост, понижение на артериалното налягане, треперене на ръцете, загуба на съзнание.

При прием на по-висока отназначената Ви доза или поява на някой от горепосочените симптоми се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Цинаризин Актавис

Ако сте пропуснали да приемете поредната доза, не приемайте двойна доза от лекарствения продукт, а вземете продукта във времето на следващия регулярен прием.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Цинаризин Актавис също може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Възможни са следните нежелани реакции:

- от страна на нервната система – слабост, умора, нарушения в координацията, главоболие, сънливост, нарушения в говора, при по-възрастни болни депресия, обърканост, двигателни нарушения.
- от страна на стомашно-чревния тракт - временни стомашно-чревни смущения, сухота в устата.
- кожни обриви, фоточувствителност, много рядко лупус еритематодес и лихен рубер планус.
- склонност към потене и увеличаване на телото.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт!

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

При температура под 25°C.

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката!

Срок на годност: 3 (три) години от датата на производство.

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка друга информация относно този продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД
ул. "Атанас Дуков" №29
1407, София България
Тел.(02) 9321 762

Последна актуализация на текста – Септември 2008 год.

