

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА ..... 19.03.05г.

Преди употреба внимателно прочетете и запазете!  
Листовка за пациента

**CINNARIZIN BIOMEDA**  
**ЦИНАРИЗИН БИОМЕДА**

**Какво представлява CINNARIZIN BIOMEDA?**

**CINNARIZIN BIOMEDA** е лекарство за поддържащо лечение при симптоми на вестибуларни нарушения и лабиринтни заболявания, включващи световъртеж, замаяност, шум в ушите, нистагъм, гадене и повръщане, профилактика на болест на пътуването.

Всяка таблетка **CINNARIZIN BIOMEDA** съдържа като лекарствено вещество cinnarizine 25 mg и следните помощни вещества: лактоза, пшенично нишесте, коповидон, магнезиев стеарат, безводен силициев диоксид.

Таблетките са бели до почти бели, кръгли, с двойноизпъкнала повърхност

**Кога не трябва да се приема цинаризин!**

**CINNARIZIN BIOMEDA** не трябва да се приема при: свръхчувствителност към цинаризин и/или флунаризин или някое от помощните вещества, паркинсонова болест, бременност и кърмене.

**Специално предупреждение!**

**CINNARIZIN BIOMEDA** може да предизвика замаяност, отпуснатост и намалена способност за концентрация на вниманието. Тези симптоми се утежняват особено при едновременно приемане с алкохол или други лекарства потискати централната нервна система. Пациенти, които шофират или управляват машини или извършват дейности изискващи повишено внимание, концентрация и бързи психо-моторни реакции трябва да бъдат предупреждавани за тези ефекти на цинаризин.

**В каква доза се приема цинаризин?**

**CINNARIZIN BIOMEDA** трябва да се приема след хранене, поради рисък от стомашно дразнене.

Заболявания с нарушен равновесие: възрастни и деца над 12 годишна възраст – 1 таблетка 3 пъти дневно.

Лечение на вертиго: ефекта на цинаризин е дозо-зависим, като дозата се повишава бавно и постепенно. Максималната дневна доза е 225 mg (9 таблетки) разделени в 3 приема.

Болест на пътуването: възрастни и деца над 12 годишна възраст – 1 таблетка се приема половин час преди пътуването. Дозата може да бъде повторена на всеки



6 часа, ако това е необходимо; деца от 6 до 12 годишна възраст – половината от препоръчителната доза за възрастни.

#### **Ако сте пропуснали доза!**

Приемете пропуснатата доза веднага щом се сетите, освен ако не е дошло време за следващата доза. Забравете за пропуснатата доза, ако вече е дошло време за следващата и продължете по обичайния дозов режим.

#### **Лекарствени и други взаимодействия!**

**CINNARIZIN BIOMEDA** може да повиши седативните ефекти на: алкохол, барбитурати, хипнотици, наркотични аналгетици, трициклични антидепресанти, седативни и транквилизатори.

Нежеланите ефекти на атропин, както и на трицикличните антидепресанти (лекарства за лечение на депресия) могат да се повишат при едновременна употреба с цинаризин.

Трябва да се посъветвате с лекар, ако ви предстои тест за алергии. Цинаризин може да маскира иначе положителни алергични реакции дори ако сте го взели 4 дни преди теста.

#### **Има ли нежелани ефекти?**

Най-често срещаният нежелан ефект в началото на терапията е отпуснатост, която обикновено е с временен характер.

Най-често срещаният антихистаминов нежелан ефект на цинаризин е седацията (от лека замаяност до тежък сън) и включва намалена способност за концентрация, отпадналост, замаяност и намалена координация. Седативните ефекти на цинаризин могат да продължат няколко дни, като бавно намаляват с времето.

Други нежелани ефекти са стомашно-чревните разстройства, които са преходни и често могат да бъдат преодолени ако дозата се повишава постепенно.

Цинаризин също така може да предизвика нарушен виждане, затруднено уриниране, дизурия, сухост в устата и стягане в гърдите.


Централните ефекти могат да включват мускулна слабост, главоболие и еуфория.

Повишаване на телесното тегло, засилено изпотяване и алергични реакции също могат да бъдат наблюдавани. Съществуват единични случаи на холестатична жълтеница (следствие задръжка на жълчка).

При възрастни пациенти и продължително приемане на високи дози цинаризин (над 150 mg дневно) могат да се наблюдават влошаване или появя на екстрапирамидални симптоми (тремор, скованост на напречноШаздената мускулатура, хипокинезия), които понякога са свързани и с депресивно настроение. При появя на тези симптоми, лечението с цинаризин трябва да спре.

#### **Как се съхранява!**

В оригинална опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25 C.



**Да се съхранява на недостъпно за деца място!**

**Срок на годност:**

5/пет/ години от датата на производство.

Таблетките не трябва да се употребяват след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката!

Ако по време на лечението таблетките променят външния си вид, трябва да преустановите употребата им от тази опаковка.

**Начин на отпускане:**

Без лекарско предписание

**Опаковка**

50 таблетки в блистер от цветно поливинилхлоридно и алуминиево фолио. Един блистер заедно с листовка за пациента се опакова в картонена кутия.

30 таблетки в блистер от цветно поливинилхлоридно и алуминиево фолио. Два блястери заедно с листовка за пациента се опаковат в картонена кутия.

**Производител**

**БИОМЕДА ООД**

4023 Пловдив, ж.р. Тракия, ул. Н.Шилева № 31

Телефон: 032/60 99 19

Факс: 032/60 99 49

E-mail: [info@biomeda.net](mailto:info@biomeda.net)

**Притежател на разрешението за употреба**

**Биомеда ООД**

4023 Пловдив, ж.р. Тракия, ул Н.Шилева. № 31

Телефон: 032/60 99 19

Факс: 032/60 99 49

E-mail: [info@biomeda.net](mailto:info@biomeda.net)

**Последна актуализация на текста: януари 2005**

