

ГУ ЧЛНителна Агенция по лекарствата	
Листовка Приложение 2	
Към РУ №: 11-1215, 04.12.04	
Одобрено 8/ 20.11.07	

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация! Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар или фармацевт!

dicetel® дицетел

Коя е активната субстанция на Дицетел?

Pinaverium bromide

Какво представлява Дицетел?

Дицетел е спазмолитично средство, което облекчава болката при стомашно-чревни или жлъчни заболявания.

За какво се използва Дицетел?

Дицетел се използва за облекчаване на болката при стомашно-чревни или жлъчни заболявания.

Това лекарство е предписано лично за Вас и не трябва да го преотстъпвате на други пациенти!

Кога не трябва да използвате Дицетел?

Ако сте алергични към активната съставка или някое от помощните вещества на Дицетел.

- Не се препоръчва употребата на Дицетел по време на кърмене!

Ако сте бременна или кърмите, винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете каквото ѝ да е лекарство!

- Да не се употребява при деца под 15-годишна възраст!

Специални предупреждения!

Лекарственият продукт съдържа бромин!

Лекарственият продукт съдържа лактоза. Пациенти с лактазна недостатъчност, галактозен интолеранс или глукозен/галактозен синдром на малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Дицетел?

Лекарствени и други взаимодействия с Дицетел не са наблюдавани.

За да избегнете взаимодействия между няколко лекарства, трябва редовно да уведомявате Вашия лекар или фармацевт за всяко друго лечение, което провеждате в момента.

В каква доза и колко често можете да приемате Дицетел?

Следните препоръки важат за Дицетел, ако Вашият лекар не е предписал друго:



3 до 4 таблетки дневно (по изключение – до 6 таблетки дневно!)

Моля, спазвайте тези указания, за да имате максимална полза от *Дицетел*!

Кога и как можете да приемате Дицетел?

- Таблетките *Дицетел* се приемат през устата, за препоръчване по време на хранене.
- Таблетките се приемат с достатъчно количество вода (1 чаена чаша).
- Таблетките не бива да се смучат или дъвчат.
- Не взимайте таблетките, когато лежите или непосредствено преди лягане.

Как други лекарствени продукти оказват влияние върху ефекта на Дицетел?

За да се избегнат възможни лекарствени взаимодействия, трябва да информирате Вашия лекар за всяко друго лекарство, което приемате в момента.

Влияе ли Дицетел върху способността за шофиране и работа с машини?

Не е наблюдавано влияние на *Дицетел* върху способността за шофиране и работа с машини.

Какви нежелани реакции може да предизвика Дицетел?

Както всички лекарства *Дицетел* може да доведе до повече или по-малко нежелани реакции.

В редки случаи, *Дицетел* може да предизвика стомашно-чревни или кожни реакции. В случай на кожен обрив, е добре да спрете лечението и да се консултирате с Вашия лекар!

Информирайте Вашия лекар или фармацевт за всякакви други нежелани реакции, неупоменати в тази листовка.

Предозиране:

При случайно приемане на по-висока от предписаната доза, незабавно уведомете Вашия лекар.

Какви инструкции за съхранение трябва да спазвате?

- Не използвайте опаковката след изтичане срока на годност, отразен върху опаковката!
- Да се съхранява на недостъпни за деца места!

Какъв е срока на годност на Дицетел?

Срокът на годност на *Дицетел* е 5 години.

Какво още съдържа Дицетел?

Микрокристална целулоза, модифицирано пшеничено нищесте, модифицирана лактоза, безводен, колоиден силициев диоксид, талк, магнезиев стеарат, стомашно-разтворима акрилова смола, макрогол 6000, сеписперс портокал К3020.

В какви опаковки се предлага Дицетел?

dicetel® таблетки от 50 mg



Опаковки по 20 филмтаблетки

Притежател на разрешението за употреба:

Solvay Pharma - France
42, rue Rouget de Lisle-B.P. 22
F 92151, Suresnes Cedex,
Франция

Производител:

Solvay Pharma - France
42, rue Rouget de Lisle-B.P. 22
F 92151, Suresnes Cedex,
Франция

Кога е изготвена тази листовка?

Април, 2004 г.

Друга информация

Внимание! Информацията в тази листовка е ограничена!

*В случай на допълнителни въпроси се обрнете към Вашия лекуващ лекар
или към:*

СОЛВЕЙ ФАРМА ЕООД
София Тауър, ет. 5, офис 52
Бул. Ал. Стамболовски 103
1303, София
Тел: ++ 3592 9234 700
Факс: ++ 3592 9234 701

