

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...05.11.08...

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР 500 mg/25 mg/200 mg гранули за перорален разтвор Парацетамол/Фенирамин малеат/Аскорбинова киселина

FERVEX ADULTS SUGSR-FREE 500 mg/25 mg/200 mg granules for oral solution Paracetamol/Pheniramine maleate/Ascorbic acid

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР и за какво се използва
2. Преди да приемете ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР
3. Как да приемате ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР
6. Допълнителна информация

Препоръчват се следните мерки при употребата на Фервекс:

- да не се прегръва стаята и въздухът да се овлажнява
- да не се пуши в стаята
- организъмът да се хидратира, като се пие вода в големи количества

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Това лекарство съдържа парацетамол.

Лекарството е комбинация от антипириетик, аналгетик, антиалергично средство и аскорбинова киселина.

То се използва за лечение на простуда, алергичен ринит, ринофарингит и грипоподобни състояния при възрастни и деца над 15 години.

ВАЖНО!



2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

Не приемайте ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР в следните случаи:

- алергия към някоя от съставките
- сериозно чернодробно заболяване
- някои форми на глаукома
- заболявания на простатата и пикочните пътища
- при деца под 15 години
- фенилкетонурия (наследствено заболяване, което се открива при раждане), поради наличие на аспартам в лекарството.

КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ ВИНАГИ СЕ СЪВЕТВАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ

▪ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Консултирайте се веднага с лекар в случай на предозиране или случайно приемане на свръх висока доза.

Това лекарство съдържа парacetamol. Други лекарства също съдържат тази субстанция. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надхвърлите препоръчваната дневна доза (виж "Дозировка").

Температурата трябва да спадне много бързо.

Не надхвърляйте посочената дозировка и се консултирайте с лекар веднага в случай на предозиране.

Не използвайте лекарството за продължително лечение без назначение от лекар, особено ако симптомите на повишена температура продължат повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни и/или се влошат или се появи друг симптом след приемане на лекарството.

• ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

- Информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай на бъбречно заболяване, бременност и кърмене;



- Информирайте Вашия лекар или фармацевт, когато едновременно с него вземате и друго лекарство.

КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

- Пазете от деца.
- По време на лечението е нежелателно да се приема алкохол или седативни средства (по-специално барбитурати).

Прием на други лекарства

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, МОЛЯ ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ, АКО ПРИЕМАТЕ ИЛИ НАСКОРО СТЕ ПРИЕМАЛИ ДРУГИ ЛЕКАРСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА, ОТПУСКАНИ БЕЗ РЕЦЕПТА.

За да избегнете вредните ефекти от предозиране, НЕ КОМБИНИРАЙТЕ други лекарства съдържащи антихистамини или парацетамол БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР.

КОГАТО СЕ СЪМНЯВАТЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

Прием на ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР с храни и напитки

По време на лечението не трябва да се приема алкохол.

Бременност и кърмене

Като предпазна мярка, това лекарство не е препоръчително по време на бременност и кърмене.

КАТО ОБЩО ПРАВИЛО, ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕНИНОСТ ИЛИ КЪРМЕНЕ ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ПРЕДИ ПРИЕМА НА НЯКАКВО ЛЕКАРСТВО.

Шофиране и работа с машини



Хората, които шофират моторни превозни средства или работят с машини, биват предупреждавани за риска от сънливост при употребата на това лекарство.

Този ефект се усилва при приема на алкохол или лекарства съдържащи алкохол.

Важна информация относно някои от съставките на ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

- СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕШЕСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕД ВИД ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПАЦИЕНТИ**

Аспартам (източник на фенилаланин) (E951), манитол.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

- ДОЗИРОВКА**

Възрастни и деца над 15 години:

По 1 саше, два или три пъти на ден.

- НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Интервалът между два приема трябва да бъде най-малко 4 часа.

Съдържанието на сашето трябва да се приема с достатъчно количество гореща или студена вода.

Перорално приложение.

- ЧЕСТОТА НА ЛЕЧЕНИЕТО**

При грипоподобни състояния се препоръчва лекарство да се взима с гореща вода вечер, щом се появят първите симптоми.

В случаи на остра бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс < 10 ml/min) интервалът между два приема трябва да бъде поне 8 часа.

НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕТО БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С ЛЕКАР.



- **ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО**

Не използвайте това лекарство за продължително лечение без консултация с лекар, особено ако симптомите продължат повече 5 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

В случай на случайно или преднамерено предозиране информирайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

- Настъпване на остръ пристъп на глаукома при хора, които имат такова предразположение
- Уринарни нарушения (значително намаляване на урината, затруднено уриниране)
- Сухота в устата, нарушения на акомодацията (способността на окото да се нагласява за виждане на различни разстояния), запек
- Нарушения на паметта или концентрацията, объркане, световъртеж (по-често при пациенти в напреднала възраст)
- Липса на координация в движенията, треперене
- Сънливост, занижено внимание – по-ясно изразено в началото на лечението
- Съобщава се за редки случаи на кожен обрив, зачеряване на кожата, или алергична реакция под формата на внезапен оток на лицето или шията, или внезапно неразположение с понижение на кръвното налягане. Лечението трябва незабавно да се преустанови, да се потърси съвета на лекар и да не се приемат повече лекарства съдържащи парацетамол или фенирамин
- Съобщава се за няколко редки случая на промяна в резултатите на лабораторните изследвания, напр. много ниски нива на някои бели кръвни телца или тромбоцити, което може да доведе до кървене от носа или венците. В такъв случай се консултирайте с лекар.



СЪОБЩЕТЕ НА НА ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСИЧКИ НЕЖЕЛANI ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ, ЗА КОИТО НЕ СЕ СЪОБЩАВА В ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

- Няма специални условия на съхранение.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР СЛЕД СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР

- Активните вещества са: парациетамол 500 mg, фенирамин малеат 25 mg, аскорбинова киселина 200 mg
- Другите съставки са: манитол, безводна лимонена киселина, повидон, безводен магнезиев цитрат, аспартам, антилски аромат за едно саше.

Как изглежда ФЕРВЕКС ЗА ВЪЗРАСТНИ БЕЗ ЗАХАР и какво съдържа опаковката

Гранули за перорален разтвор - 8 сашета в кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Bristol-Myers Squibb Kft
Lövőház u. 39. 3.em.
1024 Будапешта, Унгария

Производители:

BRISTOL-MYERS SQUIBB
304, avenue du Docteur Jean Bru
47000 Agen, Франция

BRISTOL-MYERS SQUIBB
979, avenue des Pyrénées



47520 Le Passage, Франция

BRISTOL-MYERS SQUIBB
Champ de Lachaud Goualle
19250 Meumas, Франция

Дата на последно одобрение на листовката
10/2008

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Озон Лабораторис България
ул. "Асен Златаров" № 1
1504 София
тел: 0800 12 400

