

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...09.08.05...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

FINALGEL® гел **/Финалгел /**

Състав:

Лекарствено вещество:

100 g гел съдържат:

0,50 g Piroxicam

Помощни вещества:

пропиленгликол, изопропилов алкохол, поли (оксиетилен) 7- глицерол (моно-, ди) алкооат (C8-C18), метилхидроксипропилцелулоза, натриев хидроксид, натриев метабисулфит, калиев дихидроген фосфат, пречистена вода.

Действие:

Piroxicam, активното вещество на Finalgel, притежава противовъзпалително и болкоуспокояващо действие. Локалната ефективност на 0,5% piroxicam гел е доказана при модели на животни.

Показания:

За лечение на притичащи с болка възпалителни заболявания на мускуло-скелетната система:

- тендинит, тендовагинит;
- болезнен синдром на замръзнало (сковано) рамо;
- контузии, разтягания, навяхвания.

Противопоказания:

- свръхчувствителност към пироксикам или неактивните вещества на лекарството;
- свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина или други нестериоидни противовъзпалителни средства;
- по време на третото тримесечие на бременността;
- при пациенти с бъбречна недостатъчност;
- деца под 14 години.

Предпазни мерки при употреба:

Поради липсата на достатъчно терапевтичен опит, приложението на Finalgel не се препоръчва при юноши.

Пациенти с астма, алергичен ринит, хронична обструктивна белодробна болест или хронични инфекции на белите дробове са по-чувствителни към нестериоидни противовъзпалителни лекарствени средства и реагират по-



често с пристъпи на астма, локален едем на лигавиците, кожата и уртикария.

Лекарствени и други взаимодействия:

Ако Finalgel се прилага правилно, не се очакват лекарствени взаимодействия.

Бременност и кърмене:

Трябва да бъдат спазвани стриктни предпазни мерки по отношение на употребата по време на бременност, особено през първото и второто тримесечие.

Тъй като ригоxicam се екскретира в малки количества в майчиното мляко, Finalgel не трябва да се прилага при кърмачки.

Дозировка и начин на приложение:

Ако няма друго предписание от лекаря и в зависимост от големината на болезнената област се нанася локално 3-4 пъти дневно максимално 1 г гел (с големина на лешник) и се втрива внимателно в кожата.

Продължителност на лечение:

Продължителността на лечението зависи от контрола на симптомите и варира между 2-3 седмици при тендинит и тендовагинит, както и при синдрома на замръзналото рамо, при спортни травми – 1-2 седмици.

Нежелани лекарствени реакции:

Рядко са наблюдавани локални кожни реакции. При отделни случаи са съобщени гастро-интестинални нарушения и задух.

Предозиране:

Приложението на Finalgel трябва да бъде преустановено, ако се развият нежелани лекарствени реакции.

Условия на съхранение:

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Срок на годност:

Да не се прилага след изтичане срока на годност, означен върху опаковката!

Да не се прилага по-дълго от 6 месеца след първото отваряне на продукта.

Опаковка:

Алуминиеви туби.

Притежател на разрешението за употреба:

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173



D-55216 Ingelheim am Rhein
Germany
Дата на актуализация на текста:

