

БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Сливен	Glucose Biopharm 5% инфузионен разтвор
--	--

Листовка на лекарствения продукт

Glucose Biopharm 5%, infusion solution in polypropylene bag

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Глюкоза Биофарм 5%, инфузионен разтвор в полипропиленов сак

100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

Прочетете внимателно листовката преди да започнете лечение с Glucose Biopharm 5%

-Запазете листовката. Възможно е да е необходимо отново да я прочете.

-При въпроси обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

-Лекарственият продукт е предписан на Вас.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	11-2614, 25.04.08
Одобрено:	18/03.06.08

В тази листовка

1. Какво представлява Glucose Biopharm 5%, инфузионен разтвор и за какво се използва.
2. Преди да се започне лечение с Glucose Biopharm 5%, инфузионен разтвор.
3. Как се прилага Glucose Biopharm 5%, инфузионен разтвор.
4. Възможни нежелани лекарствени реакции.
5. Условия на съхранение на Glucose Biopharm 5% като инфузионен разтвор.
6. Допълнителна информация.

Glucose Biopharm 5%, инфузионен разтвор, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЕЩЕСТВА:

Glucose Biopharm 5% е разтворител и носещ разтвор за подходящи електролити и лекарствени продукти.

1000 ml от инфузионния разтвор съдържа:

Glucose Monohydrate	55,0 g
или еквивалента на Anhydrous Glucose	50,0 g
Na ⁺	4,5 mmol/l;
Cl ⁻	4,9 mmol/l;
Калории	840 kJ/l (200kcal/l)



pH

3,5-6,5

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА:

Вода за инжекции (Water for injection)

Хлороводородна киселина (Hydrochloric acid)

Натриев хлорид (Sodium chloride)

1. КАКВО ПРЕСТАВЛЯВА Glucose Biopharm 5% инфузионен разтвор И ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА?

Glucose Biopharm 5% е лекарствен продукт за интравенозна употреба. Прилага се по лекарско предписание и е разтворител или носещ разтвор за подходящи електролити и лекарствени продукти.

2. ПРЕДИ УПОТРЕБА НА Glucose Biopharm 5%, инфузионен разтвор.

Преди употребата на Glucose Biopharm 5% съобщете, ако:

-сте хиперсензитивни (алергични) към някое от лекарствените или помощните вещества.

Лекарственият продукт не се прилага в случай на:

- Хипергликемия - повишени нива на кръвната глюкоза;
- ацидоза, нарушение на алкално - киселинното равновесие;
- хипокалиемия - намалени нива на калия;
- нарушение във водното равновесие на организма

Взаимодействия с храни и напитки

Лекарственият продукт се прилага интравенозно, по лекарско предписание.

Бременност

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употреба на лекарствени продукти.

Кърмене

Glucose Biopharm 5% е инфузионен разтвор и се прилага по лекарско предписание.

Шофиране и работа с машини

Няма данни лекарственият продукт да повлиява способността за работа с машини и дейности, свързани с шофиране.



БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Сливен	Glucose Biopharm 5% инфузионен разтвор
---	---

Прием на други лекарствени продукти

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или до скоро сте приемали други лекарствени продукти.

3. КАК СЕ УПОТРЕБЯВА Glucose Biopharm 5% инфузионен разтвор?

Прилага се под формата на интравенозна инфузия, чрез периферен венозен път. Дневната доза зависи от индивидуалните нужди на всеки пациент от глюкоза и течности. Препоръчителната доза при възрастни е 30ml-40ml/kg телесно тегло, което е еквивалент на 1,5g-2,0g глюкоза на килограм тегло. Обичайната доза се определя от Вашия лекар. При прилагане на дози по-високи от препоръчаните, може да се наблюдават повишени нива на кръвната глюкоза, поява на глюкоза в урината, нарушения в електролитното равновесие. Ако имате съмнения, че Glucose Biopharm 5% има прекалено силен или слаб ефект върху Вас, обърнете се към Вашия лекар.

Ако сте приели по-голяма от предписаната доза:

Glucose Biopharm 5% е разтвор за интравенозно приложение и се прилага по лекарско предписание.

Ако сте пропуснали прием на:

Вливанията на лекарствения продукт се контролират от медицински персонал.

При спиране на лечението с:

Glucose Biopharm 5% се прилага по лекарско указание.

4. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТЕРБА

БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД, БУЛ. ТРАКИЯ №75, 8800 - СЛИВЕН

5. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарствени продукти прилагането на Glucose Biopharm 5% инфузионен разтвор може да доведе до нежелани лекарствени реакции. Ако установите нежелани лекарствени реакции, които не са упоменати в листовката, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

6. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°C

Да се съхранява на място, недостъпно за деца



БИОФАРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. Сливен	Glucose Biopharm 5% инфузионен разтвор
---	---

7. СРОК НА ГОДНОСТ

2 (две) години след датата на производство.

Да не се прилага след посочения срок.

8. ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

