

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Нуротиазид® 25 mg tablets
Хипотиазид 25 mg таблетки
Хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)

УДЛ
ОДОБРЕННО!
датата R-8451, 8452 / 19-11-88

Нуротиазид® 100 mg tablets
Хипотиазид 100 mg таблетки
Хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Хипотиазид и за какво се използва
2. Преди да приемете Хипотиазид
3. Как да приемате Хипотиазид
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хипотиазид
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХИПОТИАЗИД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Хипотиазид е диуретик (увеличава отделянето на урина от организма) и служи за понижаване на кръвното налягане. Основното му действие е да потиска реабсорбцията на соли и следователно реабсорбцията на вода в бъбреците, като по този начин се постига диуретичен ефект и се понижава кръвното налягане.

Хипотиазид се използва за лечение на отоци от различен произход (при сърдечно-съдова недостатъчност, при цироза на черния дроб и при предменструални състояния).

Както и за лечение на хипертония (високо кръвно налягане) самостоятелно или в комбинация с други лекарствени продукти за понижаване на кръвното налягане.

При безвкусен (незахарен) диабет намалява честото уриниране.

При пациенти с хиперкализиурия (увеличен калций в урината) намалява отделянето на калций.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ХИПОТИАЗИД

Не приемайте Хипотиазид

- при реакции на свръхчувствителност към активното вещество, към други съставни части от състава на лекарствения продукт или към сулфонамиди.
- Тежка бъбречная и чернодробна недостатъчност.
- При кърмене

Обърнете специално внимание при употребата на Хипотиазид

При продължително лечение се препоръчва консумацията на храни богати на калий (плодове, зеленчуци и др.), както и консултация с лекар.



Изиска се повищено внимание при пациенти с тежко церебрално и коронарно заболяване, при нарушение в метаболизма на пикочната киселина и заболяване на черния дроб и бъбреците. При пациенти с диабет е възможно да повлияе върху действието на антидиабетичните средства. При лактозна непоносимост трябва да се има предвид съдържанието на лактоза в състава на таблетките: Хипотиазид 25 mg съдържа 63 mg и таблетките Хипотиазид 100 mg съдържат 39 mg лактоза.

При всяко посещение, уведомявайте Вашия лекар, ако употребявате Хипотиазид, тъй като медикаментът може да повлияе върху резултатите при някои лабораторни изследвания.

Да се избягва употребата на алкохол по време на лечение с Хипотиазид.

Употреба на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Употребата на няколко лекарствени продукта едновременно може да промени тяхното действие.

- Да не се употребява с лекарствени продукти, съдържащи литиеви соли.
- Намалява ефекта на лекарствени продукти, предназначени за понижаване на кръвната захар.
- Едновременната употреба с някои сърдечно-съдови препарати изиска повищено внимание.
- Може да засили ефекта на някои антихипертензивни (за високо кръвно налягане) средства.
- Някои лекарствени продукта могат да засилят отделянето на калий
- Употребата на алкохол, хипнотици (сънотворни лекарствени продукти) могат да доведат до засилване на ортостатичната хипотония (виене на свят при рязко ставане от легнало или седнало положение).

Бременност и кърмене

Само лекар може да прецени евентуалната му употреба и то след внимателна преценка на съотношението риск/полза.

Да не се употребява по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

В начало на лечението шофирането и работата с машини се забранява, като единствено лекуващия Ви лекар може да определи периода на забраната.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ХИПОТИАЗИД

Винаги приемайте Хипотиазид точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировката се определя индивидуално и изиска стриктен медицински контрол, като броя таблетки и продължителността на употреба се определят от лекуващия лекар. В случай на продължителна употреба или при лечение с високи дози, са необходими както лабораторен контрол, така и допълнителен прием на калий и магнезий.

Таблетките се приемат след хранене.

Ако не е предписано друго, обичайната дозировка е:

За възрастни и деца над 12 години: първоначалната доза е 25-100 mg дневно и в зависимост от клиничния отговор може да се намали до поддържаща дневна доза от 25-50 mg.

Деца: обичайната дневна доза е 1-2 mg/kg на телесно тегло.

Ако сте приемали повече от необходимата доза Хипотиазид

При предозиране са налични следните симптоми: слабост, вертиго (замайване), объркане, нарушенa чувствителност, гадене, повръщане, жажда, затруднено уриниране, променени стойности на лабораторни показатели.



В случай на инцидентно предозиране, информирайте незабавно лекуващия Ви лекар или се обадете в спешно отделение към най-близката болница.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Хипотиазид може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Наблюдават се следните нежелани лекарствени реакции: анорексия (липса на апетит за хранене), гадене, повръщане, стомашни оплаквания, диария, запек, чувство за жажда, вертиго (замайване), мускулни спазми, слабост, ортостатична хипотония (замайване след рязко ставане от легнало или седнало положение), главоболие, тахикардия (ускорена сърдечна дейност), аритмия (нарушен ритъм на сърцето), нарушено виждане, жълтеница, алергични кожни състояния, фоточувствителност, треска (висока температура).

При нарушение в метаболизма на пикочната киселина, протичащо без симптоми, са възможни появата на пристъпи на подагра.

За всяка спомената или неописана в тази листовка нежелана лекарствена реакция, трябва незабавно да информирате вашия лекар.

Прекъсване на лечението се осъществява при алергични състояния, тахикардия (ускорена сърдечна дейност), намаляване на уринирането. Веднага се обърнете за съвет към лекуващия Ви лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ХИПОТИАЗИД

Съхранявайте при стайна температура (15-25°C), на защитено от светлина място.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Хипотиазид

- Активното вещество е: хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide)
- Другите съставки са: магнезиев стеарат, желатин, талк, царевично нишесте, лактозаmonoхидрат.

Как изглежда Хипотиазид и какво съдържа опаковката

20 таблетки, поставени в термоустойчиви PVC/ Alu блистери

Притежател на разрешението за употреба

Санофи-Авентис България ЕООД,
София 1303, Бул. Ал. Стамболовски 103,
България

Производител
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.,
1045 Budapest, To. u. 1-5, Унгария



и

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Co. Ltd.
2112 Veresegyhaz, Levai u.5, Унгария

Дата на последна редакция на текста
Август 2008

