

ЛИСТОВКА : ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ЙОДСЕПТАДОН® 10%

Cutaneous solution

Povidone iodine

ЙОДСЕПТАДОН® 10%

Дермален разтвор

Йод повидон

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 328, 30.10.08

Одобрено: N = 6/23.09.2008

Прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка е отразено:

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЙОДСЕПТАДОН® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЙОДСЕПТАДОН®

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ ЙОДСЕПТАДОН®

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА ЙОДСЕПТАДОН®

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЙОДСЕПТАДОН® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарственият продукт ЙОДСЕПТАДОН® е показан като:

- Антисептик при ненаранена кожа.
- Пре-, интра- и постоперативна обработка на кожата.
- Антисептик при наранена кожа, включително при повърхностни рани, при изгаряния, декубитуси и язви на подбедрицата.
- Употребява се и за аспетична обработка на ръцете, както и на вътрешните и външните отдели на урогениталната система, при катетризация на пикочния мехур.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЙОДСЕПТАДОН®

Не прилагайте ЙОДСЕПТАДОН®:



при известна свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

ЙОДСЕПТАДОН® не трябва да се прилага при пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, влияещи се от йод..

ЙОДСЕПТАДОН® е противопоказан преди и след лечение с радиоактивен йод.

Поради отсъствие на данни за безопасността на ЙОДСЕПТАДОН® при бременност и кърмене, лекарственият продукт не трябва да се използва от бременни жени и кърмачки.

ЙОДСЕПТАДОН® е противопоказан при новородени и деца на възраст под 6 месеца.

ЙОДСЕПТАДОН® е противопоказан при пациенти с херпетiformен дерматит.

Прилагане на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства, включително и такива отпускати без рецепт.

ЙОДСЕПТАДОН® е несъвместим с лекарствени продукти съдържащи соли на среброто, поради което не трябва да се използва съвместно с лекарствени продукти съдържащи silver sulfadiazine поради риск от компрометиране на ефекта и от образуване на сребърен йодид с разяждащо действие. ЙОДСЕПТАДОН® е несъвместим също така и с вещества с редукционни свойства, алкални соли, танинова киселина, салицилати, тауролидин и бисмутови соли. Йодът реагира с живачни съединения и образува живачен йодид със силно разяждащо действие.

Освобождаващият се от ЙОДСЕПТАДОН® активен йод окислява ензимните компоненти на някои продукти за обработка на рани и декубитални язви и може напълно да компрометира ефективността им.

ЙОДСЕПТАДОН® трябва да се прилага внимателно при пациенти лекувани с литиеви соли, защото потенциалната системна резорбция на йод може да потенцира инхибиращото действие на лития върху функциите на щитовидната жлеза.

Системната резорбция на йод след локално прилагане на ЙОДСЕПТАДОН® е свързана с риск от компрометиране на някои лабораторни тестове като например функционалните тестове за изследване на щитовидната жлеза. Може да предизвика лъжливо-положителни тестове за хематурия или за кръв във изпражненията.

Прием употреба на ЙОДСЕПТАДОН® с храни и напитки

ЙОДСЕПТАДОН® се прилага локално и не съществува риск от повлияване на ефектите му от взаимодействия с храни.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.



ЙОДСЕПТАДОН® е противопоказан по време на бременност и кърмене. Попадналият в системната циркулация йод преминава през плацентарната бариера и се натрупва в щитовидната жлеза на плода, като може да предизвика тежки увреждания на нейните функциите при новороденото. Йодидите се екскретират в кърмата.

Шофиране и работа с машини

ЙОДСЕПТАДОН® не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ ЙОДСЕПТАДОН®

Винаги прилагайте ЙОДСЕПТАДОН® точно както Ви е казал вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайното приложение е както следва

- Дезинфекция на ръце. Като средство за хигиенна дезинфекция – 3 ml **ЙОДСЕПТАДОН®** се втриват в ръцете в продължение на 1 минута, след което се изплакват. За хирургична дезинфекция на ръцете поне 2 x 5 ml **ЙОДСЕПТАДОН®** се втриват в кожата на китките и предмишниците. Кожата трябва да е напоена с **ЙОДСЕПТАДОН®** поне в продължение на 5 минути.
- За обработка на рани, за предоперативна и постоперативна антисептична обработка **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага неразреден.
- За предоперативен лаваж, при приложение върху външните урогенитални органи и влагалището **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага неразреден.
- За почистване и обработка на изгаряния **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага неразреден и се изплаква с топъл, изотоничен солеви разтвор.
- За антисептичен лаваж, лечение на рани, обработка на декубитуси или язви на подбедриците **ЙОДСЕПТАДОН®** се използва неразреден. Раните и язвите се обработват чрез промиване, повърхностна обработка или под пропускливи превръзки, които трябва да се подменят два пъти на ден.
- За антисептично измиване на рани, участъци с леки кожни инфекции или слабо инфицирани изгаряния **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага разреден в съотношение 1:3 с вода като кожата се обработва в продължение на 5 минути. За цялостно антисептично изкъпване **ЙОДСЕПТАДОН®** се разрежда в съотношение 1:100 с вода и се изчаква 15 минути за проявяване на ефекта.
- При катетризация на пикочния мехур входните отвърстия на катетъра се обработват с неразреден **ЙОДСЕПТАДОН®**. Когато се използва за антисептична промивка на катетъра **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага разреден в съотношение от 1:20 до 1:50.
- Антисептичната обработка на ортопедични оперативни ранни **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага разреден в съотношение 1:20 със стерилен изотоничен солеви разтвор.
- За дезинфекция на ръбовете на костни фрактури **ЙОДСЕПТАДОН®** се прилага разреден в съотношение 1:10 със стерилен изотоничен солеви разтвор.



Когато се използва като кожен антисептик, за дезинфекция на влагалището, уретрата и маточната шийка лекарственият продукт се използва неразреден. Освен ако не е изрично указано разрежданията на препарата се извършват със стерилен изотоничен солеви разтвор или със стерилна вода. За да се избегне замърсяване с патогенни бактерии и респективно замърсяване на оперативни рани или изгорени повърхности е необходимо разрежданията да се извършват непосредствено преди употреба и използваните материали – марли, памук и др. и да не се държат предварително напоени с ЙОДСЕПТАДОН®.

Като антисептик ЙОДСЕПТАДОН® се използва за измиване, лаваж и оцветяване на засегнатите области, при което те трябва да се обработват с лекарствения продукт до пълното им омокряне, след което трябва да останат в контакт с ЙОДСЕПТАДОН® поне 2 минути. Обагрянето на обработваните повърхности от характерния за препарата кафяв цвят е показател за ефективността на антисептичното действие – оцветените участъци са асептични. Продължителността на прилагане на лекарствения продукт варира според индивидуалната индикация, и зависи от чувствителността на потенциалните патогени, например някои вируси и бактериалните спори изискват 15 минути.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства ЙОДСЕПТАДОН® може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Ако някое от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

ЙОДСЕПТАДОН® се характеризира с много по-добра поносимост от спиртните разтвори на йод като нежеланите лекарствени реакции, които са установени са предимно локални. Възможно е локално дразнене, парене и сърбеж и реакции на свръхчувствителност, но те са много по редки и слабо изразени в сравнение с тези при прилагане на луголов разтвор или спиртен разтвор на йод. ЙОДСЕПТАДОН® може да предизвика системни ефекти поради резорбция на йод, като риска е по голям при третиране на големи повърхности, особено при изгаряния, обширни раневи лезии както и при продължително лечение. Описани са ефекти като хипо- или хипертироидизъм, хипернатриемия, метаболитна ацидоза, бъбречна недостатъчност.

При инцидентен или умышлен перорален прием ЙОДСЕПТАДОН® крие рисък от тежка интоксикация с метален вкус в устата, диария, метаболитна ацидоза, електролитен дисбаланс, увреждане на щитовидната жлеза. Макар и рядко, симптоми на системна интоксикация с йод могат да се наблюдават и при локално приложение на ЙОДСЕПТАДОН® особено при продължително третиране на обширни раневи повърхности и при изгаряния.



интоксикацията с йод са свързани със стимулиращото му влияние върху жлезите с външна секреция – ринорея (обилио отделяне на воднист секрет от носа), конюнктивити, продуктивна кашлица. При тежки отравяния могат да настъпят сериозни усложнения лактатна ацидоза, оствър респираторен дистрес синдром и застойна сърдечна недостатъчност.

5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА ЙОДСЕПТАДОН®

Срокът на годност на ЙОДСЕПТАДОН® в оригиналната опаковка е 3 години.

След първоначалното отваряне на опаковката - 2 месеца.

Да се съхранява добре затворен при температура до 25°C на защитено от светлина и недостъпно за деца място.

Специални условия на съхранение

Да се съхранява добре затворен при температура до 25°C на защитено от светлина и недостъпно за деца място.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ЙОДСЕПТАДОН®

- Активно вещество: В 100 ml се съдържа активното вещество повидон-йод 10%.
- Помощни вещества: лимонена киселинаmonoхидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат, пречистена вода.

Как изглежда ЙОДСЕПТАДОН® и какво съдържа опаковката

Първична опаковка – тъмна стъклена или пластмасова бутилка, затворена с апликатор и капачка на винт или с каучукова запушалка, обкантена с алуминиева капачка.

Вторична опаковка - бутилка от 100 ml заедно с листовка поставена в сгъваема картонена кутия.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА.

“Химакс Фарма” ЕООД – София, ул. “Горица” 8А, България

Тел. 02/856-31-43; 955-62-98; факс: 955-42-78

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба “Химакс Фарма” ЕООД – София, ул. “Горица” 8А.

ДАТА НА ПОСЛЕДНО ОДОБРЕНИЕ НА ЛИСТОВКАТА: АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА * ОКТОМВРИ 2008 г.

