

## ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

LACIPIL 4 mg film-coated tablets  
ЛАСИПИЛ 4 mg филмирани таблетки

ласидипин (lacidipine)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ЛИСТОВКА ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	3332, 31.10.08
Одобрено: 23/30.09.08	

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ЛАСИПИЛ и за какво се използва
2. Преди да приемете ЛАСИПИЛ
3. Как да приемате ЛАСИПИЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ЛАСИПИЛ
6. Допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАСИПИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Активното вещество ласидипин принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти. То се използва за лечение на артериална хипертония (високо кръвно налягане).

### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ЛАСИПИЛ

Не приемайте ЛАСИПИЛ:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към ласидипин или някоя от останалите съставки на ЛАСИПИЛ
- ако страдате от тежка аортна стеноза или тежко чернодробно увреждане с чернодробна недостатъчност.

Важно е да уведомите Вашия лекар:

- ако сте прекарали накратко инфаркт на миокарда.
- ако страдате от заболяване на сърцето (стенокардия, нарушение на сърдечния ритъм, сърдечна недостатъчност)
- ако имате рядко наследствено заболяване, свързано с непоносимост към някои захари.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или накратко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.

Особено внимание е необходимо:

- ако приемате други лекарства за лечение на високо кръвно налягане
- ако приемате лекарства за лечение на нарушение на сърдечния ритъм
- ако приемате лекарства от групата на трицикличните антидепресанти
- ако приемате лекарствата erythromycin (еритромицин), telmisartan (тероиденадин),



**cimetidine (циметидин).**  
Не трябва да приемате ЛАСИПИЛ със сок от грейпфрут.

#### **Бременност и кърмене**

По време на бременност и кърмене ЛАСИПИЛ може да се прилага само в случай, че лекарят прецени, че очакваните ползи от лечението на майката са по-големи от възможните рискове за детето.

#### **Шофиране и работа с машини**

Това лекарство няма да повлияе върху способността Ви да шофирате или работите с машини.

След прием на първата доза от лекарството е възможно да се появи замаяност. Тази нежелана реакция е временна и изчезва при продължаване на лечението с ЛАСИПИЛ в същите дози.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ЛАСИПИЛ**

Винаги приемайте ЛАСИПИЛ точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната начална дозировка на ЛАСИПИЛ е 2 mg веднъж дневно. Лекарството трябва да се приема всеки ден по едно и също време, за предпочтение сутрин, независимо от храненето.

Лекарят може да прецени, че във Вашия случай се налага дозата на лекарството да бъде увеличена до 4 mg и при необходимост до 6 mg, като увеличаването на дозата трябва да става с интервал от време най-малко няколко седмици.

Трябва да продължите да приемате лекарството дори след като почувствате подобреие. Не спирайте приема на лекарството, докато лекарят не Ви каже.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза ЛАСИПИЛ**

Ако случайно сте приели твърде много таблетки, незабавно потърсете лекарска помощ.

#### **Ако сте пропуснали да приемете ЛАСИПИЛ**

Ако сте забравили да приемете някая доза, не се беспокойте. Приемете дозата веднага, след като си спомните и продължете да приемате следващите дози точно според определеното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства ЛАСИПИЛ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

#### **Чести нежелани реакции**

- главоболие, замаяност, сърцебиене, засилване, оток. Тези реакции обикновено са леки и преходни, и изчезват при продължаване на лечението с ЛАСИПИЛ в същите дози.
- стомашен дискомфорт, гадене
- кожен обрив (включително сърбеж и засилване на кожата)
- често уриниране
- астения (обща умора)
- обратимо повишаване на стойностите на ензима алкална фосфатаза.

#### **Нечести нежелани реакции**

- влошаване на съществуваща стенокардия



- набъбване и уплътняване на венците.

#### **Редки нежелани реакции**

- алергични реакции като надигнат и сърбящ обрив (уртикария) и подуване, понякога на лицето или устата (ангиоведем), което може да причини затруднение в дишането. Ако получите тези нежелани реакции незабавно потърсете лекарска помощ.

#### **Много редки нежелани реакции**

- треперене на ръцете или краката.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ЛАСИПИЛ**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте ЛАСИПИЛ при температура под 30°C.

Да се пази от светлина. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Ако се налага прием на половин таблетка от 4 mg, неприетата половина трябва да се съхранява в оригиналната фолиева опаковка и да се приеме в рамките на следващите 48 часа. В противен случай трябва да се изхвърли.

Не използвайте ЛАСИПИЛ след срока на годност, отбелаязан върху опаковката.

### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Какво съдържа ЛАСИПИЛ**

Активното вещество е ласидипин. Всяка филмирана таблетка съдържа 4 mg ласидипин.

Другите съставки са: лактозаmonoхидрат, повидон K30, магнезиев стеарат, опадрай бяло YS-1-18043 (хипромелоза, титанов диоксид, полиетиленгликол 400, полисорбат 80) или опадрай бяло OY-S-7335 (титанов диоксид (E171), хипромелоза).

#### **Как изглежда ЛАСИПИЛ и какво съдържа опаковката**

Таблетките ЛАСИПИЛ 4 mg са овални, бели, с делителна черта от двете страни. Всяка опаковка съдържа 28 филмирани таблетки.

**Притежател на разрешението за употреба:** Glaxo Group Ltd., Greenford road, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Великобритания, представляван в България от ГлаксоСмитКлейн ЕООД, София 1408, ул. Димитър Манов бл.10.

**Производител:** GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 189 Grunwaldzka street, 60-322 Poznan, Полша или Glaxo Wellcome S.A., Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero (Burgos), Испания.

Дата на последно одобрение на листовката:

LACIPIL (ЛАСИПИЛ) е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

