

Информация за пациента

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

Laif® 900, 900 mg film-coated tablets

Лайф® 900, 900 mg филмирани таблетки

Сух екстракт от жълт кантарион (*Hiperici herbae extractum siccum*) (3 - 6 : 1)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 1290, 15-09-08

Одобрено: N=3/21.04.2008

Какво представлява Лайф 900?

Растителен лекарствен продукт за употреба при депресивни разстройства.

За какво се използва Лайф 900?

Леки до умерени депресивни разстройства.

Кога не трябва да използвате Лайф 900?

Лайф 900 не може да се приема едновременно с циклоспорин, сиролимус, таクロлимус или индинавир респ. други протеазни инхибитори при анти-ХИВ терапия, иринотекан и други цитостатики, както и други антидепресанти.

Лайф 900 не трябва да се приема при известна свръхчувствителност към жълтия кантарион или някое от помощните вещества в лекарството, при известна свръхчувствителност на кожата към светлината както и при тежки депресивни епизоди. Да не се приема от деца под 12 години.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Лайф 900?

При едновременна употреба Лайф 900 може да намали ефикасността на антикоагуланти от типа на кумарина (фенпрокумон, варфарин), имунодепресанти (циклоспорин, сиролимус, таクロлимус), дигоксин, теофилин и амитриптилин.

При пациенти, които приемат такива лекарства, трябва да бъдат провеждани подходящи контроли на лечението особено в началото и след приключване на приема на Лайф 900 (напр. определяне на концентрацията на лекарството в плазмата или цялата кръв) (виж също „Взаимодействия с други лекарствени средства и други форми на взаимодействие“).

По време на употребата на Лайф 900 трябва да се избягва интензивно облъчване с ултравиолетови лъчи (продължителни слънчеви бани, кварцова лампа, солариум) или да се осигури достатъчна защита от слънцето.

При жени, които приемат орални хормонални контрацептиви, е възможно междуенно кървене като следствие от лекарствено взаимодействие. В такива случаи е необходимо да бъдат предприети допълнителни мерки за предпазване, тъй като сигурността на контрацепцията като цяло може да бъде понижена.


Когато едновременно се прилагат други лекарства, се изисква внимание дори и след прекратяване приема на Лайф 900.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Лайф 900 или могат да бъдат повлияни?

В единични случаи са били установени взаимодействия с дадените по-долу лекарствени вещества, при които може да се стигне до отслабване на терапевтичния им ефект:

Антикоагуланти от типа на кумарина (напр. фенпрокумон, варфарин), имуносупресиви (напр. циклоспорин, сиролимус, таクロлимус), дигоксин, индинавир и други протеазни инхибитори при анти-ХИВ терапията, иринотекан и други цитостатики, амитриптилин, мидазолам, теофилин.

Лекарства, съдържащи жълт кантарион, могат да подпомогнат метаболизирането на лекарствените средства, които се метаболизират чрез цитохром P450 ензимна система. От това може да следва отслабване и/или намаляване на действието на съответното лекарствено средство.



При едновременен прием на определени антидепресанти (нефазодон, пароксетин, сертралин) техният терапевтичен ефект може да се засили. В единични случаи могат да настъпят нежелани реакции в засилена степен (серотонинергични ефекти) като гадене, повръщане, страх, беспокойство и обърканост.

При едновременна терапия с други лекарствени средства, които въздействат фотосенсибилизиращо, съществува теоретична вероятност за засилване на фототоксичните реакции (виж „Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Лайф 900?”).

При жени, употребяващи орални хормонални контрацептиви, които взимат Лайф 900, има вероятност от поява на междуинно кървене, както и понижаване на сигурността на контрацепцията.

Ето защо, във всички случаи на прием заедно с други лекарства трябва да бъде потърсен съвет от лекар.

Специални предупреждения:

Лайф 900 съдържа лактозаmonoхидрат. Продуктът е неподходящ при хора, с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен / галактозен синдром на малабсорбция.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

Не е налице достатъчно опит, свързан с употребата на екстракти от жъlt кантарион по време на бременност и кърмене. Поради това Лайф 900 не трябва да се употребява през периода на бременност и кърмене.

Как можете да използвате Лайф 900 и колко дълго?

Ако няма друго предписание, се приема по 1 филмирана таблетка с малко течност веднъж дневно след закуска, без да се сдъвква.

Тъй като в първите дни на приложение, лечебното въздействие на лекарственото средство се изгражда постепенно, Лайф 900 трябва да се приема без прекъсване в продължение на 14 дни, за да бъде постигнат желания ефект.

По принцип продължителността на употреба не е ограничена, като отчетливо подобреие се наблюдава след 4-6 седмици на употреба. В случай, че до този момент не настъпи подобреие или симптомите се влошават, трябва да се потърси консултация с лекар.

Какво трябва да предприемете ако сте приели по-голямо количество Лайф 900 ?
В случай, че сте приел Лайф® 900 в твърде големи количества или сте забравил да го приемете, трябва да продължите да го приемате според предписанието на лекуващия Ви лекар или както е дадено в упътването за дозиране.

След прием на значителни свръхдози, кожата трябва да бъде защитена от слънчева светлина и UV лъчение за период от 1 до 2 седмици, поради възможна повишена фоточувствителност (ограничаване на престоя на открито, слънцезащита с покриваща кожата облекло и използване на средства за слънчева защита с висок слънцезащитен фактор, т.нар. „слънчеви блокери”). Описаните нежелани лекарствени реакции могат да се появят и в по-голяма степен.

Засега няма сведения за тежки отравяния с препарати от жъlt кантарион при човека.

Какви нежелани лекарствени реакции може да предизвика Лайф 900?

Възможно е повишаване на светочувствителността на кожата (фотосенсибилизация) особено при хора със светла кожа.

В редки случаи е възможна появата на стомашно-чревни оплаквания; кожни алергични реакции като зачервяване, оток и/или сърбеж на кожата; умора.

Указание:

Лайф® 900 не променя възможностите за реакция и не пречи на способността за активно участие в пътното движение.



Как да съхранявате Лайф 900?

Лайф® 900 трябва да се съхранява при температура под +25 °C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност:

Срокът на годност е 36 месеца.

Лайф® 900 не бива да се използва след изтичане на срока на годност, отбелаязан върху опаковката.

Състав:

1 филмирана таблетка съдържа:

Активно вещество:

Hipericia herabae extractum siccum (сух екстракт от жълт кантарион) (3 - 6 : 1) - 900,0 мг
(Екстрагент: 80 об. % етанол)

Помощни вещества:

Карбокси метил нишесте натрий, кроскармелоза натрий, Еудрагит® E 100, високодисперсен силициев диоксид, лактозаmonoхидрат, макрогол 4000, магнезиев стеарат (растителен), натриев хидроген карбонат, рибофлавин E 101, талк, титанов диоксид E 171.

Лекарствена форма и съдържание

Филмирана таблетка

Оригинална опаковка от 20 филмирани таблетки

Оригинална опаковка от 60 филмирани таблетки

Оригинална опаковка от 100 филмирани таблетки

Производител и притежател на разрешението за употреба:

S T E I G E R W A L D

Arzneimittelwerk GmbH

Havelstraße 5

64295 Darmstadt

Германия

Медицинско представителство в България: Либра ЕАД

Дата на актуализиране на текста

Март 2008 г.

Лекарството да се съхранява на място, недостъпно за деца!

По лекарско предписание

