



## **ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

**Lioton 1000® Gel**

**Лиотон 1000 гел**



ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
дата ... 10.02.04г...

При:

Умора, отичане и болки в краката

Разширени вени

Синини от контузии



Уважаеми Госпожо/Господине,

Благодарим Ви, че избрахте нашия лекарствен продукт Лиотон 1000 гел. Моля, прочетете внимателно следната листовка за пациента, преди да започнете Вашето лечение. За допълнителна информация се обръщайте се към Вашия лекар или фармацевт.



### Lioton 1000® Gel

### Лиотон 1000 гел

ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ (прилагане върху кожата)

**Какво съдържа Вашето лекарство?**

*Лекарствено вещество*

Един грам *Лиотон 1000 гел* съдържа 1000 IU heparin sodium.

*Помощни вещества*

Карбомер 940, метил-пара-хидроксибензоат, пропил-пара-хидроксибензоат, етилов алкохол, масло от портокалови цветове, лавандулово масло, триетаноламин и дестилирана вода.

*Опаковка*

*Лиотон 1000 гел* е безцветен, прозрачен гел с приятен аромат, който не е мазен и не оставя петна.

*Лиотон 1000 гел* е опакован в меки алуминиеви туби. Алуминиева мембрана е поставена на отвора на тубата и е необходимо да бъде пробита с капачката преди употреба.

*Лиотон 1000 гел* може да намерите в туба от 30 g или от 50 g.

**Как действа *Лиотон 1000 гел*?**

*Лиотон 1000 гел* е хепаринов продукт под форма на гел за външно приложение, поради което е показан за лечение, самостоятелно или в комбинация със системна терапия, при тези болестни, възпалителни или травматични състояния, които се повлияват благоприятно от лекарства с противосърваща, противовъзпалително и противоотечно действие.



### **Какво лекува Лиотон 1000 гел?**

*Лиотон 1000 гел* е предназначен за лечение на заболявания на повърхностните вени като варикозно разширени вени и свързаните с тях усложнения: флеботромбоза, тромбофлебит, повърхностен перифлебит, варикозни язви, следоперативен варикофлебит, последствия след сафектомия (отстраняване на вена сафена).

*Лиотон 1000 гел* се прилага и при травми и контузии, локализиран оток и инфильтрати, подкожни хематоми, травми и навярвания на мускулите, сухожилията и ставните връзки.

### **Кога не трябва да се прилага Лиотон 1000 гел?**

Не трябва да използвате *Лиотон 1000 гел*, ако сте свръхчувствителни към хепарин или някое от помощните вещества на лекарството.

*Лиотон 1000 гел* не трябва да се използва в случай на кръвотечение, върху открити рани и върху лигавици, както и върху инфицирани участъци при наличие на гнойни процеси.

Поради ограничен опит и липса на данни, не трябва да се използва при деца.

### **Какво трябва да знаете преди да започнете приложението на Лиотон 1000 гел?**

Употребата на *Лиотон 1000 гел* при наличие на признаци за кръвотечение, трябва внимателно да се преценява.

*Лиотон 1000 гел* съдържа помощните вещества метил- и пропил-прахидроксибензоат и за това не трябва да се използва при пациенти със свръхчувствителност към тези вещества.

### **Какви взаимодействия може да има между Лиотон 1000 гел и други лекарства, с които се лекувате?**

Приложението на *Лиотон 1000 гел* може допълнително да увеличи времето на кръвосъсирване при пациенти, приемащи перорални противосъсирващи лекарства.

### **Може ли да се прилага Лиотон 1000 гел по време на бременност и кърмене?**

Няма налични данни за използването на *Лиотон 1000 гел* по време на бременност или в периода на кърмене.

### **Повлиява ли Лиотон 1000 гел способността за шофиране и работа с машини?**

*Лиотон 1000 гел* не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **Как се прилага Лиотон 1000 гел?**

Един до три пъти дневно, 3-10 см гел се нанасят върху засегнатия участък от кожата и леко се втряват.

### **Какво да правите в случай на Лиотон 1000 гел?**

Въпреки че до момента не са описани случаи на предозиране, при поява на съмнение за такова се обърнете към Вашия лекар. Той следва да противодейства на ефекта на heparin sodium c protamine sulfate.

### **Какви нежелани лекарствени реакции може да причини Лиотон 1000 гел?**

Много рядко може да възникнат алергични реакции към хепарина в мястото на приложение. В изолирани случаи могат да се появят реакции на свръхчувствителност, като зачервяване на кожата и сърбеж, които изчезват след преустановяване на лечението.

### **Как да съхранявате Лиотон 1000 гел?**

Да се съхранява под 25°C!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

**Притежател на разрешението за употреба и производител на лекарствения продукт:**

A.MENARINI

Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.



Via Sette Santi 3  
Флоренция, Италия

Разпространява се от:  
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)  
Glienicker Weg 125  
12489 Берлин, Германия

**Срок на годност**

5 години.

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката!

**Дата на последна редакция на листовката**

Март 2003

