

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

MEDOFLOXINE / МЕДОФЛОКСИН

(Ofloxacin)

филмирани таблетки 200 mg

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 11.07.06г.

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечението с Medofloxine. В нея е дадено само резюме от наличната информация. Ако имате въпроси или не сте сигурни за неща, запитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво трябва да знаете за Вашия лекарствен продукт ?

Името на Вашето лекарство е Medofloxine. Една филмирана таблетка съдържа като лекарствено вещество 200 mg Ofloxacin, а така също и помощни вещества: натриева кроскармелоза, повидон, лактоза, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, хидроксипропилметилцелулоза, титаниев диоксид и полиетиленгликол.

Medofloxine се предлага в опаковка от 10 филмирани таблетки.

Офлоксацин е от групата лекарствени продукти, наричани флуорохинолонови антибактериални лекарствени продукти. Той убива някои бактерии и лекува инфекцията, причинена от тях.

Притежател на разрешението за употреба и производител на Medofloxine е:

Medochemie Ltd., p.o. box 51409, Limassol, Cyprus

Medofloxine се използва за лечение на някои инфекции, причинени от бактерии:

- Цервикална и уретрална гонорея (трипер), без усложнения;
- Не-гонококов цервицит и уретрит;



- Смесени уретрални и цервикални инфекции (инфекции на уретрата и шийката на матката, причинени от няколко микроорганизма);
- Простатит (възпаление на простатата);
- Тазово-възпалителна болест;
- Инфекции на долните дихателни пътища – бактериална екзацербация на хроничен бронхит, придобита в обществото пневмония;
- Респираторни инфекции при муковисцидоза;
- Инфекции на костите, кожата и меките тъкани, вкл. инфицирани рани;
- Абдоминални (коремни) инфекции, включително холангит (възпаление на цлъчните пътища);
- Инфекции на горните и долните пикочни пътища;
- Чревни инфекции, включително болест на пътуването.

Вашият лекар може да Ви каже за каква инфекция Ви лекува.

**Преди да започнете употребата на Вашия лекарствен продукт,
кажете на лекаря:**

- Страдате ли от чернодробно заболяване?
- Страдате ли от бъбречно заболяване или се подлагате на диализа?
- Дали Вие или този за когото е предназначено лекарството е дете, подрастващ юноша или във възрастта преди пубертета?
- Боледували ли сте от тендинит (възпаление на сухожилие)?
- Имали ли сте хрипове, затруднено дишане или оток на лицето след прием на Ofloxacin или друго подобно лекарство?
- Боледувате ли или сте боледували от епилепсия или гърчове?
- Бременна ли сте или се съмнявате, че сте бременна?
- Кърмите ли?

Ако отговорите с да на някой от тези въпроси, не използвайте Medofloxine. Отидете при Вашия лекар и обсъдете въпроса с него.

Вие трябва да уведомите Вашия лекар, какви други лекарства употребявате, макар че е възможно да ги вземате заедно с Medofloxine. Уведомете го и за лекарствата, които купувате без рецепт, включително антиацидни препарати и витаминни добавки съдържащи желязо и цинк.



Кажете на Вашия лекар, дали:

- Приемате лекарства за диабет (глибенкламид)?
- Употребявате ли лекарства за рак (метотрексат)?
- Приемате ли лекарства за подагра или подагрозен артрит?
- Използвате ли лекарства за стомашни смущения (антиацидни продукти, циметидин)?
- Приемате ли лекарствени продукти, разреждащи кръвта (антикоагуланти)?
- Вземате ли отводнителни таблетки (фуроземид)?
- Употребявате ли антиастматични средства (теофилин)?
- Приемате ли противовъзпалителни средства за болка и възпаление на ставите (НСПВС)?

Ако отговорите с да на някой от въпросите, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете употребата на Medofloxine.

Как да приемате Вашия лекарствен продукт?

Таблетките Medofloxine трябва да се гълтат цели с чаша вода. Не ги чупете и не ги стривайте.

Таблетките трябва да се вземат 2 часа преди или след като се приеми антиациден лекарствен продукт, продукт срещу парене в стомаха (сукралфат) или лекарство, съдържащо желязо или цинк, в противен случай Medofloxine няма да окаже пълното си действие.

Трябва да взимате таблетките в интервалите указанi от лекаря. Винаги ги спазвайте, те трябва да бъдат означени и върху етикета. Прочитайте ги всеки път. Ако не сте сигурни или сте объркали, запитайте Вашия лекар или фармацевт.

Лекарят ще реши от какво количество Medofloxine се нуждаете. То зависи от вида и тежестта на инфекцията. Вашият лекар може да Ви даде повече обяснения.

Обичайната доза е между 200 mg (1 таблетка) и 800 mg (4 таблетки) дневно. Наведнъж се приемат не повече от 400 mg (2 таблетки). Ако предписаната доза е повече от 400 mg дневно вие трябва да я приемате, разделена на 2 еднакви дози на 12 часа.

Не трябва да употребявате повече от 4 таблетки на ден. Продължителността на лечение също е различна, обикновено от 5 до 10 дни. При някои инфекции е необходима само една доза. Вие не трябва да използвате продукта повече от 2 месеца.



Какво трябва да се направи, ако пропуснете доза?

Ако забравите да вземете една доза, не се беспокойте, вземете я веднага щом си спомните. Ако наближава времето за следващата доза, вземете я в обичайния час и оставете пропуснатата доза. Не приемайте едновременно 2 дози.

Какво трябва да се направи, ако приемете повече от предписаното?

Ако случайно приемете повече от предписаното, веднага поискайте съвет от Вашия лекар или фармацевт или отидете в най-близката болница. Винаги носете със себе си опаковката, за да може в болницата да разберат какво е лекарството.

Много е важно да продължите приема на Medofloxine докато свършите всички таблетки, които лекарят Ви е предписал. Не спирайте да ги взимате дори и когато се почувствате по-добре, защото в противен случай инфекцията може да се появи отново и ще бъде по-трудно да се излекува. Вашият лекар или фармацевт могат да Ви дадат още обяснения по въпроса.

Какви предпазни мерки са необходими при лечение с Медофлоксин?

По време на лечението с Medofloxine трябва да избягвате прекаленото излагане на слънце, слънчеви бани, тъй като в редки случаи може да се предизвика кожна реакция (фоточувствителност).

Понякога Medofloxine може да предизвика замайване, сънливост, зрителни смущения и намаляване на сръчността. Трябва да се сигурни, че те не са се появили при Вас, ако ще шофирате или работите с машини.

Алкохолът може да засили нежеланите реакции на Medofloxine затова не трябва да употребявате алкохол по време на лечението.

Ако по време на лечението с Medofloxine ще Ви правят изследване на урината, трябва да предупредите лабораторията, че приемате Medofloxine тъй като той може да даде фалшиви резултати за някои от тестовете.



Бременност и кърмене

В случай на бременност и кърмене употребата на Medofloxine не е показана, освен ако Вашия лекар не Ви посъветва друго.

След лечение с Medofloxine !

Както при всички лекарства, така и при Medofloxine някои хора могат да получат нежелани реакции. Те се наричат странични ефекти.

Ако получите някоя от следните редки нежелани реакции, преустановете приема на Medofloxine и веднага се свържете с Вашия лекар:

- Болка в черния дроб, отделяне на много тъмна урина;
- Водниста, кървава диария;
- Кожен обрив, лъщене на кожата, сърбяща и подута кожа;
- Болка или повищена чувствителност в някоя става;
- Треска;
- Подуване на лицето или устната, хрипове или затруднено дишане;
- Ускорен пулс, слабост, прилошаване.

Може да получите и по-малко тежки реакции, които не са обичайни:

- Замайване, главоболие;
- Безпокойство, смущение на съня, съниливост, кошмари;
- Чувство на страх, обърканост, депресия, халюцинации;
- Тремор, неустойчиво движение;
- Изтърпване или мравучкане по кожата;
- Слухови смущения, промяна на вкуса, загуба на обонянието, зрителни смущения. Ако се получат след първата доза, преустановете употребата на Medofloxine и веднага посетете Вашия лекар.

Най-обичайните и по-леки реакции са:

- Стомашна или коремна болка;
- Гадене и повръщане;
- Диария;
- Загуба на апетит.



Тези реакции обикновено са леки и отзвучават по време на лечението или след това. Ако получите някоя от тези реакции и тя е по-тежка, продължава дълго време или Ви притеснява, разговаряйте с Вашия лекар или фармацевт.

Не се беспокойте от този списък на възможните реакции, при Вас може да не се прояви нито една от тях.

Ако наблюдавате други, не описани по-горе реакции за които смятате, че се дължат на Medofloxine уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Как трябва да съхранявате Вашия лекарствен продукт?

Съхранявайте Medofloxine в оригиналната опаковка, на място недостъпно за деца, сухо и защитено от светлина, при температура под 25 °C.

Не използвайте таблетките след изтичане срока на годност, означен върху картонената кутия и блистера.

Ако лекарят Ви нареди да спрете употребата на лекарството, занесете останалите таблетки на Вашия фармацевт.

Друга информация

Тази листовка не съдържа пълната информация за Medofloxine. Ако искате да узнаете повече, или ако имате въпроси, запитайте Вашия лекар или фармацевт.

Помнете: лекарят е предискал това лекарство на ВАС. Никога не го давайте на друг.

Не изхвърляйте листовката, докато не сте приключили лечението с Medofloxine. Може да поискате да я прочетете отново.

Дата на последна редакция на текста: Юни, 2005 г.

MEDOFLOXINE е запазена търговска марка.

Информацията в тази листовка се отнася само за **MEDOFLOXINE**.

