

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 17.10.06г.

Информация за пациента

Вашият лекар Ви е предписал Megace. Тази листовка Ви предоставя кратка информация за това лекарство. Ако искате да знаете повече или има неща, в които не сте сигурни, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е за Вас. Само лекар може да Ви го предпише. НИКОГА не давайте лекарството на друг, даже и да има същите симптоми, защото можете да му навредите.

НАИМЕНОВАНИЕ

MEGACE®

Megestrol Acetate

Megace

СЪСТАВ

Активна съставка: megestrol acetate 160 mg.

Помощни вещества: колоиден силициев двуокис, лактозаmonoхидрат, магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, повидон, натриев нишестен глюколат.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

таблетки

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС

Megace спада към групата лекарства наречени "гестагени" и е свързан с естествено срещащия се хормон наречен прогестерон.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Bristol-Myers Squibb

Avenue du Dr.Gilles, 28230 Epernon, France

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bristol-Myers Squibb Kft;

Szatadsag ter 7;

1054 Будапеща, Унгария

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО?

Терапевтични показания

Megace се използва за лечение на някои видове рак известен като "хормоно-зависим" рак, в т.ч. рак на гърдата или матката.

СЛУЧАИ, В КОИТО ТОВА ЛЕКАРСТВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА

Противопоказания

- алергична реакция към подобни таблетки или към някоя от съставките на Megace
- бременност и кърмене



- тромбофлебит (образуване на кръвен съсирак във вената, съпроводено от възпаление на венозната стена)
- чернодробно заболяване

МОГАТ ЛИ ДА СЕ ПРИЕМАТ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВА?

Можете да приемате и други лекарства по време на лечението с Megace, но трябва да уведомявате Вашия лекар за всички лекарства, които приемате. Става дума както за лекарствата, купени от аптека, така и за тези закупени без рецепт.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КОНСУМИРА АЛКОХОЛ?

Няма взаимодействие между Megace и алкохол в умерено количество. Все пак, посъветвайте се с лекар дали можете да консумирате алкохол.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ШОФИРА?

Megace не влияе върху Вашата способност да шофирате.

MEGACE ВЛИЯЕ ЛИ ВЪРХУ КРЪВНАТА ЗАХАР В СЛУЧАЙ НА ДИАБЕТ?

Megace може да повиши кръвната захар. Ако забележите, че кръвната Ви захар е по-висока от нормалното, консултирайте се с Вашия лекар.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Megace не трябва да се прилага по време на бременност. Ако приемате Megace през първите 4 месеца на бременността или ако забременеете докато приемате това лекарство, трябва да знаете, че съществува опасност от увреждане на плода. Винаги трябва да се консултирате с лекуващия лекар в такива случаи. Ако сте в детеродна възраст, трябва да избягвате забременяване докато вземате Megace. По време на лечението с това лекарство не трябва да кърмите.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Дозировка и честота на приложението

За лечение на рак на гърдата обичайната доза е 160 mg megestrol acetate на ден.

За лечение на рак на лигавицата на матката /ендометриум/, дозата обикновена варира между 40 mg и 320 mg на ден.

Това лекарство не се препоръчва за деца.

Следвайте винаги лекарските инструкции.

Метод и начин на приложение

Таблетките трябва да се приемат с чаша вода, без значение дали е преди или след хранене.

Продължителност на лечението

Обикновено е необходимо лечението с Megace да продължи два месеца, за да се почувства ефекта от Megace. Продължете да вземате таблетките докато лекарят не Ви посъветва да спрете лекарството. Някои пациенти вземат Megace в продължение на много години.



ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на предозиране идете в най-близката болница или се консултирайте незабавно с Вашия лекар. Носете празната опаковка и лекарството, което е останало в нея.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ БЪДЕ ПРОПУСНАТА ДОЗА, КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

Ако сте пропуснали доза, не се тревожете. Ако си спомните няколко часа след пропускане на дозата, вземете я възможно най-бързо, но ако е настъпило време за следващата доза, пропуснете забравената и продължавайте както преди. НЕ ВЗЕМАЙТЕ двойна доза, която да компенсира пропуснатата.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Всички лекарства имат някои нежелани ефекти. Следващите нежелани реакции може да са причинени от кръвосъсиреци. В някои случаи кръвосъсиреците може да се окажат фатални. Те настъпват рядко, но ако все пак Ви се случат, уведомете незабавно Вашия лекар:

- Загуба на координация /внезапна/
- Неясен говор /внезапно/
- Болки в ръцете, слабините или крака /особено в прасеца/
- Задъхване /внезапно/
- Слабост, изтръпване или болка в ръката или крака
- Главоболие /остро или внезапно/
- Припадък

Наблюдавани са следните нежелани реакции:

Увеличен апетит, наддаване на тегло, задържане на вода /подуване на глезените и ходилата/, гадене, повръщане, промени във вагиналното кървене /внезапно/.

По-рядко срещани нежелани реакции включват: задъхване, горещи вълни, промени в настроението, повищено кръвно наплягане, повищена кръвна захар, почервяване на лицето и шията, увеличено окосмяване на лицето и тялото, уртикария, опадане на косата, болка или скованост на пръстите.

Може да има и временно увеличение на признаките и симптомите на Вашето заболяване.

Ако някой от тези симптоми продължава, консултирайте се с Вашия лекар. Ако забележите други нежелани реакции, уведомете Вашия лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте Megace таблетки под 25°C. Таблетките не трябва да бъдат на твърде топло или влажно място, затова не ги оставяйте в близост до радиатор, на прозореца или в банята.



Не използвайте лекарството след изтичане срока на годност, обозначен върху опаковката.

Съхранявайте на места, недостъпни за деца.

Дата на последна редакция: м.януари 2006 г.

