

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

MUKOSEPTONEX® Nasal drops, solution МУКОСЕПТОНЕКС Капки за нос, разтвор

Carbethopendecinium bromide
Карбетопендицин бромид

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
Това лекарство се продава без рецепт. Въпреки това, за постигане на възможно най-добрият
результат от лечението, Вие трябва да използвате Mukoseptonex® внимателно.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Информирайте Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошават или не се продобряват след
3-дневно приложение.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или
фармацевт.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА

1. Какво представлява Мукосептонекс и за какво се използва
2. Преди да използвате Мукосептонекс
3. Как да използвате Мукосептонекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Мукосептонекс
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА Агенция по ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №:	11-2624, 25.07.08
Одобрено: 18/03.06.08	

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

IVAX Pharmaceuticals s.r.o.,
Ostravska 29
747 70 Opava – Komarov
Република Чехия

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МУКОСЕПТОНЕКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарственият продукт дезинфекцира лигавицата на носа.

Капките за нос, съдържащи локално действащ антисептик са удобни в определена концентрация за по-продължително приложение за дезинфекция на лигавицата на горните дихателни пътища.

Използва се за лечение на хронични възпаления на лигавицата на носа, назофаринкса и околоносните кухини, ако не са съпроводени с повишена слузна секреция на лигавицата или ако набъбналата лигавица не блокира носните пътища. Мукосептонекс може да се използва след лечение на остри възпаления на носната лигавица, напр. след предшестващо краткотрайно лечение с Мукосептонекс Е.



2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МУКОСЕПТОНЕКС

Не използвайте Мукосептонекс:

- Ако сте алергичен към активните съставки или някое от помощните вещества;

Обърнете специално внимание при употребата на Мукосептонекс:

- Ако не се наблюдава облекчаване на симптомите в продължение на 3 дни или състоянието Ви се влошава, ако наблюдавате никакви необичайни реакции, моля свържете се с Вашия лекар.

Прием на други лекарства

Консултирайте се с Вашия лекар относно едновременното приложение на Мукосептонекс с други лекарствени продукти. Ако Вашия лекар Ви предпише други лекарства, информирайте го, че използвате Мукосептонекс.

Бременност и кърмене

Приложението на Мукосептонекс по време на бременност и кърмене не е противопоказано, ако лечебният ефект надвишава възможния рисков.

Шофиране и работа с машини

Мукосептонекс не оказва влияние върху дейности, изискващи повишено внимание (шофиране на моторни превозни средства, работа с машини и работа на високи места).

3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ МУКОСЕПТОНЕКС

Дозировка и начин на приложение на Мукосептонекс

Възрастни: 2-3 капки в носа 5 пъти дневно

Деца над 2 години: 1-3 капки в носа 3 пъти дневно

Кърмачета: 1 капка във всяка ноздра 3 пъти дневно.

Интервалът между отделните дози трябва да е най-малко 5 часа. Капките трябва да се използват в продължение на 7 дни, освен ако лекарят не е предписал друго.

Ако сте приложили по-голямо количество Мукосептонекс отколкото трябва

Ако Вие сте приложили по-голямо количество от лекарствения продукт, отколкото е необходимо, информирайте незабавно Вашия лекар. В случай на предозиране или ако мислите, че дете или възрастен случайно са погълнали никакво количество от лекарството, моля консултирайте се незабавно с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приложите Мукосептонекс

Ако забравите да приложите дозата в определеното време, приложете я възможно най-скоро след като си спомнете и след това продължете с приложението в обичайните интервали, като никога не комбинирайте две дози.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате никакви въпроси относно употребата на Мукосептонекс капки за нос.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Рядко се наблюдават кожни реакции по време на приложение при свръхчувствителни пациенти.

Нарушения на кожата и подкожните тъкани

Обрив (след приложение при свръхчувствителни пациенти).

При евентуална појва на други нежелани или необичайни реакции, посъветвайте се с Вашия лекар относно по-нататъшното приложение на Мукосептонекс.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МУКОСЕПТОНЕКС

Да се съхранява на сухо и тъмно място при температура под 25°C. Да се пази от замръзване.

Да се съхранява на място недостъпно за погледа и досега на деца.

Не използвайте Мукосептонекс след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, след означението "Годен до:" Означението "Годен до:" отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Мукосептонекс :

- Активната съставка е карбетопендицин бромид 5,5 mg в 10 ml капки за нос, разтвор.
- Другите съставки са: динатриев едетат дихидрат, динатриев хидрогенфосфат додекахидрат, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, повидон 25, пречистена стерилна вода.

Какво съдържа опаковката

Стъклен флакон от 10 ml.

Дата на последна редакция на листовката

Май 2007

