

ИАЛ  
ОДОБРЕН  
ДАТА 08.08.06г.

**PANADOL™ Soluble (Paracetamol)**  
**ПАНАДОЛ™ Растворим (Парацетамол)**

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

**Състав:** Всяка разтворима таблетка съдържа Paracetamol 500 mg.

Също така съдържа сорбитол, натриев захарин, повидон, натриев лаурил сулфат, диметикон, лимонена киселина и натриев карбонат.

**Показания:** Panadol Soluble е обезболяващо и температуропонижаващо средство и е показан за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъббол, невралгия, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, дисменореа, болки при възпалено гърло.

**Характеристики:** Panadol Soluble съдържа парацетамол - аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Panadol Soluble не дразни стомаха.

**Противопоказания: Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.** Не взимайте Panadol Soluble, ако сте алергични към парацетамол.

Много рядко е съобщавано за промени в кръвната картина, но тези промени не са били задължително свързани с приемането на парацетамол.

**Противопоказания / предупреждения при употреба:** Преди да вземете Panadol Soluble, консултирайте се с Вашия лекар, ако имате остро бъбречно или чернодробно заболяване, или ако взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин. Ако взимате антикоагуланти - лекарства, използвани за разреждане на кръвта, и трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период, може да приемате обичайните дози парацетамол. Ако сте бременна, консултирайте се с Вашия лекар преди да вземете Panadol Soluble.

Всяка таблетка съдържа 427mg / за таблетка натрий (854mg натрий за доза от две таблетки). По тази причина лекарственият продукт не е подходящ за лица на нискосолева диета.

**Дозировка:**

**Възрастни** - 1-2 таблетки, разтворени в чаша с вода, на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки за период от 24 часа.

**Деца (6 до 12 години)** - 1/2 до 1 таблетка да се разтвори в чаша с вода и да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа.

Не давайте на деца повече от 3 дни без консултация с лекар.

Да не се дава на деца под 6 годишна възраст, освен по лекарско предписание.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.



**Не надвишавайте посочената доза.** Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

**Нежелани лекарствени реакции:** При парациетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочеквани реакции.

**Срок на годност:** Не използвайте след датата, посочена на опаковката.  
Срок на годност - 4 години.

**Условия на съхранение:** Да се съхранява при температура под 25°C.  
**Да се пази на места, недостъпни за деца.**

**Притежател на разрешението за употреба:**  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,  
GlaxoSmithKline Export Ltd.,  
Brentford, TW8 9GS, UK

Panadol™ е търговска марка.  
GSK logo

