

Прочетете внимателно листовката преди да започнете да прилагате това лекарство.
 Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 Ако имате още въпроси, моля попитайте лекуващия си лекар или фармацевта.
 Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори и ако симптомите им са същите като Вашите.

Pyrazinamid tablets 500 mg / Пиразинамид таблетки 500 мг
 Pyrazinamide / пиразинамид



Лекарствено вещество: *pyrazinamide* (пиразинамид).

Помощни вещества: царевично нишесте, предварително желатинизирано нишесте, натриево карбоксиметилово нишесте (тип A), талк, магнезиев стеарат, натриев лаурил сулфат.

Име и адрес на производителя и на притежателя на разрешението за употреба:
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PYRAZINAMID И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Състав

1 таблетка съдържа 500 mg pyrazinamide.

Опаковка

Съваема кутия със 100 таблетки в стъклена бутилка.

Какво представлява Pyrazinamid?

Pyrazinamide е лекарство, което се използва за лечение на туберкулоза (туберкулостатик). Той разрушава туберкулозните бактерии във фазата на вътреклетъчно деление. Той е особено ефективен в първите месеци на лечение. Винаги се прилага заедно с други туберкулостатици (isoniazid, ethambutol, rifampicin) за предотвратяване на развитието на резистентни щамове на туберкулозните бактерии.

За какво се използва Pyrazinamid?

Лекарството се прилага при лечение на всички форми на туберкулоза (в комбинация с други туберкулостатици).

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ PYRAZINAMID

Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, обменно заболяване, ако сте свръхчувствителни или ако вземате други лекарства.

Кой не трябва да приема Pyrazinamid?

Не трябва да приемате лекарството, ако сте свръхчувствителни към pyrazinamide или други съставки на това лекарство, ако имате тежко нарушение на чернодробната функция или остра подагра.

Предпазни мерки и предупреждения

Преди началото на лечението кажете на лекуващия си лекар, ако се лекувате от диабет, чернодробно заболяване, бъбречно заболяване, подагра или порфирий.

По време на лечението на пациенти с диабет желаните концентрации на кръвната захар се поддържат трудно.





При пациенти с порфирия рутазинамид може да предизвика оствър пристъп на порфирия. При пациенти с бъбречна недостатъчност рутазинамид може да започне да се натрупва в организма.

Преди началото на лечението и по време на лечението лекуващият лекар понякога ще ви изпраща за изследвания на кръвта. Честотата на контролните изследвания ще се определя от лекаря.

Важно е да приемате редовно лекарството и да продължите лечението дори и ако се чувствате по-добре. Ако няма отговор към лечението до две или три седмици или ако болестта се влошава, незабавно се консултирайте с лекуващия си лекар.

Незабавно спрете приема на лекарството и уведомете лекуващия си лекар, ако получите:

- болка в горната дясната част на корема, липса на апетит, сутрешно гадене, потъмняване на урината и/или жълтеница,
 - подуване, зачеряване и болка на ставата на палеца на крака или на някоя друга става.
- Уведомете лекуващия си лекар, ако сте свръхчувствителни към ethionamide, isoniazid, niacin или други химически сродни лекарства, тъй като може да сте свръхчувствителни също и към рутазинамид.

Прием на Pyrazinamid с храна и напитки

Приемайте лекарството с малко течност, като еднократна доза след закуска.

Не се препоръчва употребата на алкохол по време на лечение с рутазинамид, тъй като рутазинамид може да засили токсичните ефекти на алкохола.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с лекуващия си лекар или фармацевта преди да вземете някакво лекарство.

Въпреки че няма данни за вредни ефекти на рутазинамид върху плода, рисъкът не може да се изключи.

Преди началото на лечението кажете на лекуващия си лекар, ако сте бременна или кърмите. Незабавно уведомете лекуващия си лекар, ако забременеете по време на лечението.

Бременните жени трябва да приемат лекарството само ако категорично се нуждаят от него. Решението за лечение по време на бременност или преустановяване на лечението се взема от лекаря.

Рутазинамид се отделя в малки количества в кърмата и поради това не се препоръчва кърмене по време на лечение.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини


Не е известно рутазинамид да повлиява общо бдителността на пациента при шофиране на моторни превозни средства и работа с машини.

Какви други лекарства може да взаимодействват с Pyrazinamid?

Уведомете лекуващия си лекар или фармацевта, ако приемате или сте приемали доскоро други лекарства, освен тези, които са ви предписани.

Необходимо е да кажете на лекуващия си лекар, ако вземате лекарства за лечение на епилепсия (phenytoin), диабет, вирусни инфекции (zidovudine), подагра или лекарства за елиминиране на никочната киселина (allopurinol, colchicine, probenecid, sulfipyrazone) и имуносупресори (cyclosporine).

Едновременното приложение на рутазинамид и phenytoin може да доведе до интоксикация с phenytoin. Ако по време на едновременно лечение с рутазинамид и phenytoin се появят некоординирани движения (атаксия), засилени рефлекси (хиперрефлексия), неволеви очни движения (нистагъм) и/или треперене или тръскане на ръцете (премор), спрете приема на лекарството и се консултирайте с лекуващия си лекар.



Едновременната употреба на pyrazinamide и другите гореспоменати лекарства може да промени действието и да засили или намали ефектите на тези лекарства или на pyrazinamide.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ PYRAZINAMID

Дозировка и метод на приложение

Спазвайте стриктно указанията на лекуващия си лекар. Не трябва да променяте дозите или да преустановявате лечението, без да се консултирате с лекуващия си лекар преди това.

Обичайната доза pyrazinamide при възрастни е 15 до 30 mg/kg телесно тегло дневно. Максималната дневна доза не трябва да надхвърля 2 g.

Обичайната доза за деца е също 15 mg до 30 mg/kg телесно тегло дневно; максималната дневна доза не трябва да надхвърля 2 g.

При приложение два или три пъти седмично, при пациенти в напреднала възраст, болни с бъбречно или чернодробно увреждане и пациенти на хемодиализа или перитонеална диализа дозите се определят от лекаря.

Лекарят ще определи продължителността на лечението.

Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е много силен или твърде слаб, моля консултирайте се с лекуващия си лекар или с фармацевта.

Ако приемете повече Pyrazinamid отколкото трябва

Ако сте взели по-голяма доза от необходимото, незабавно се консултирайте с лекуващия си лекар или фармацевта.

Ако някой пациент е погълнал по-голям брой таблетки и е в съзнание, предизвикайте повръщане и се консултирайте с лекар.

Ако забравите да приемете Pyrazinamid

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Pyrazinamid също може да има нежелани реакции.

Най-сериозните нежелани реакции са нарушенията на чернодробната функция (от жълтеница, увеличение на черния дроб, безсимптомно повишение на активността на чернодробните трансаминази до редки случаи на остра активна чернодробна атрофия и смърт), които зависят от дозата. Поради това преустановете приема на лекарството и незабавно уведомете лекуващия си лекар, ако се появи болка в горната дясна част на корема, повишена температура, загуба на апетит, слабост, сутрешно гадене, повръщане, тъмна урина и/или жълтеница.

По-рядко са наблюдавани повръщане, болки в мускулите и ставите с повишение на телесната температура, реакции на свръхчувствителност (кожен обрив, уртикария, сърбеж, фоточувствителност), сидеробластна анемия и тромбоцитопения.

Редки нежелани реакции при лечението с pyrazinamide са акне, пелагра, порфирия, болки при уриниране (дизурия) и възпаление на бъбреците (интерстициален нефрит).

Ако забележите някои нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте лекуващия си лекар или фармацевта.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА PYRAZINAMID

Срок на годност

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичането на срока на годност, отбелязана върху опаковката.



Условия на съхранение

Да се пази от влага и светлина. Да не се съхранява при температура над 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Информация за предписване

Само по лекарско предписание.

Редакция

17 октомври, 2003 г.

