

**ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
**RHINATHIOL 2 % CHILDREN, syrup**  
**РИНАТИОЛ 2 % ЗА ДЕЦА, сироп**  
**Карбоцистеин (carbocisteine)**

**ИАЛ  
ОДОБРЕНО!**  
ДАТА ..... 20.10.08

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Ринатиол 2% сироп и за какво се използва
2. Преди да приемете Ринатиол 2% сироп
3. Как да приемате Ринатиол 2% сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Ринатиол 2% сироп
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РИНАТИОЛ 2% СИРОП И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**  
Ринатиол 2% за деца е сироп против кашлица, спадащ към фармако-трапевтичния клас на муколитиците.

Това лекарство улеснява отделянето на бронхиалната секреция чрез експекторация (отхрачване).

Използва се при бронхиална обструкция (запушване на бронхите) и нужда от втечняване на секрета при остръ бронхит.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ РИНАТИОЛ 2% СИРОП**

**Не приемайте Ринатиол 2% сироп:**

- при алергия към някоя от съставките, особено към парабен (метил парагидроксибензоат).

**Обърнете специално внимание при употребата на Ринатиол 5% сироп**

Трябва да се консултирате с лекар в случай на:

- обилен или гноен секрет
- ако вашето дете има хронично (продължително) заболяване на бронхите или белите дробове.

Лекарства, подтикващи кашлицата или лекарства изсушаващи бронхиалния секрет не трябва да се употребяват докато се използва това лекарство.

**Предпазни мерки при употреба**

Трябва да се консултирате с лекар в случай на язва на стомаха или дванадесетопърстника.  
В случай на диабет или ниско-захарна диета, трябва да се има предвид захарозното съдържание (3,5 g на една мерителна лъжиичка).

**ПРИ СЪМНЕНИЕ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.**

**Прием на други лекарства**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или ниско-захарна диета приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецепт.



#### **Бременност и кърмене**

Това лекарство може да се употребява по време на бременност само след консултация с лекар. Ако забременеете по време на употреба, се консултирайте с Вашия лекар. Само той може да прецени дали да продължите неговата употреба.

Можете да кърмите докато приемате това лекарство.

По принцип, ако сте бременна или кърмите, и в двата случая трябва да се консултирате с Вашия лекар.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ РИНАТИОЛ 2% СИРОП**

Винаги приемайте Ринатиол 2% сироп точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Перорално приложение.

\*Кърмачета и деца от 1 месец до 2 години: СЛЕДВАЙТЕ ЛЕКАРСКОТО ПРЕДПИСАНИЕ

Дозата трябва да бъде определена в зависимост от теглото на детето.

\*Деца от 2 до 5 години:

Една мерителна лъжичка от 5 ml два пъти дневно.

\*Деца над 5 години:

Една мерителна лъжичка от 5 ml три пъти дневно.

Не надвишавайте лечението повече от 8 до 10 дни без консултация с лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Ринатиол 2% сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Възможност от:

- стомашно-чревни разстройства (стомашна болка, гадене, разстройство). В този случай трябва да намалите дозата.
- риск от уртикария, поради наличе на парабен (метил парагидроксибензоат).

### **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ РИНАТИОЛ 5% СИРОП**

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Ринатиол 2% сироп след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.

Да се съхранява при температура под 25°C.

След първото отваряне на бутилката сиропът е годен до един месец по лекарствата

### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**



### **Какво съдържа Ринатиол 2% сироп**

- Активното вещество е : Карбоцистеин (carbocisteine)-2.0g
- Другите съставки са: захароза, метилпараходроксибензоат (Е 218), ванилин, кохинил червено А (Е 124), подсладител малина, подсладител череша, натриев хидроксид, дестилирана вода  
за 100 ml сироп

Една мерителна лъжиčка от 5 ml съдържа 100 mg карбоцистеин, 3.5 g захароза и 13 mg натрий.

### **Как изглежда Ринатиол 2% сироп и какво съдържа опаковката**

Ринатиол 2% сироп се предлага в бутилка от 125 ml, поставена в картонена опаковка.

### **Притежател на разрешението за употреба:**

Санофи-Авестис България ЕООД  
София 1303  
Бул. Ал. Стамболовски 103  
България

### **Производител:**

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE  
1-3, allée de la Neste  
ZI en Sigal  
BP 319  
31773 COLOMIERS Cedex, FRANCE

Дата на последна редакция на листовката Юли 2008

