

25-03-03

## Информация за пациента

### SIGNOPAM СИГНОПАМ Таблетки

#### Състав

Лекарствено вещество	Temazepam	10mg
Помощи вещества	Картофено нишесте, оризово нишесте, желатин, нишестен натриев гликолат, талк, магнезиев стеарат, лактоза.	

#### Свойства и действие

Темазепам принадлежи къмベンзодиазепиновите производни. Действа на структурите на ЦНС, свързани с регулацията на емоционалната активност. Клиничното действие на темазепама се проявява с успокояващ и противотревожен, а също с достатъчно силен и кратък сънотворен ефект. Оказва умерено спазмолитично и отслабващо мускулния тонус на скелетната мускулатура действие.

#### Показания

- Разстройства на съня (трудности при заспиване, чести и ранни сутрешни събуждания)
- Премедикация – подготовка на оперативни интервенции и тежки диагностични процедури.

#### Противопоказания

- Свръхчувствителност къмベンзодиазепини
- Нарушено дишане от централен произход и тежко състояние на дихателна недостатъчност, независимо от причините
- Тежка чернодробна недостатъчност
- Мускулна слабост
- Глаукома
- Нарушения на съзнанието
- Бременност

#### Нежелани лекарствени реакции

##### Най-често

- Сънливост, главоболие, световъртеж, обща слабост, нервност и отпадналост

##### Рядко

- Страх, депресивни състояния или еуфория
- Сухост на лигавицата на устната кухина

- Стомашно-чревни оплаквания ( гадене, диария, чувство на дискомфорт в коремната област)
- Дезориентация
- Отслабване на паметта, концентрацията на вниманието и забавени реакции
- Неясно зрение

*Много рядко*

- Липса на апетит
- Нарушена координация на движение и равновесие
- Задух, сърдебиене
- Парадоксални реакции (психомоторна възбуда, страх, безсъние). В този случай незабавно да се прекрати лечението.

**Системното приемане в течение на седмици може да доведе до зависимост и абстинентен синдром при рязко прекратяване .**

**Лекарствени и други взаимодействия**

Депресивното влияние на темазепама върху ЦНС се усилва от всички лекарствени продукти с подобно действие (барбитурати, продукти, понижаващи артериалното налягане с централно действие, невролептици, антидепресанти, спазмолитици, наркотични аналгетици).

Употребата на алкохол по време не лечение с темазепам , освен сумиращото депресивно влияние на ЦНС може да провоцира парадоксални реакции- психомоторна възбуда, агресивно поведение или състояние на патологично опиянение. Патологичното опиянение не зависи от вида и количеството на изпития алкохол, понякога са достатъчни и малки количества.

Приетите през устата контрацептиви могат да ускорят биотрансформацията на темазепама и да намалят неговото действие.

**Дозировка и начин на приложение**

**По лекарско предписание.**

*Възрастни*

- При разстройство на съня- 30 min преди лягане 10-20 mg  
При по-тежки случаи на безсъние- до 60mg
- Премедикация- 30 до 60 min преди оперативната интервенция или диагностичното изследване 20-40mg

*Деца*

**Безопасността и ефективността на темазепама за възрастта под 18 години не е установена.**

*Болни над 65 години*

**Необходимо е особено внимание при изписването на продукта.**

Препоръчват се намалени наполовина дози.

*Болни с нарушен функции на черния дроб и бъбреците*

Препоръчва се намаляване на дозите.

Прекратяването приема на продукта не трябва да става рязко, а с постепенно намаляване на дозите, контролирано от лекаря. Рязкото спиране на темазепама може да доведе до разстройства на съня и настроението. Особено опасно е рязкото спиране при продължителна терапия или терапия, изискваща по-големи дози. В подобни случаи симптомите са винаги ясно изразени.

**Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба**

- Системното приемане на продукта води до постепенно отслабване действието му в резултат от развитие на толерантност.
- Продължителното приложение може да доведе до психическа и физическа зависимост и абстинентен синдром при рязко спиране. Синдромът на абстиненция се характеризира с психомоторна възбуда, страх, вегетативни нарушения и безсъние.
- При лица, предразположени към зависимост от лекарствени и др. продукти е необходимо особено внимание.
- В случай на появя на парадоксални реакции- страх, безсъние, състояние на психомоторна възбуда, незабавно трябва да се спре лечението.
- Да не се употребява алкохол по време на терапията и 3 дни след приключването ѝ
- Поради опасност от суицидни опити, при депресия не се препоръчва темазепам.

**Бременност и кърмене**

*Бременност*

Темазепам е противопоказан при бременни.

*Кърмене*

Темазепам е противопоказан при кърмене.

В случай, че е наложително приемането му от майката, да се преустанови кърменето.

**Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

По време на лечение с продукта и 3 дни след приключването му да не се шофира и да не се обслужват механични устройства.

**Срок на годност**

3 години

**Специални условия на съхранение**

Да се съхранява под 25 ° С.

Да се пази от светлина и влага.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

**Опаковка**

Блистер, 20 табл., заедно с информационна листовка опаковани в индивидуална картонена кутия с всички необходими означения.

**Име и адрес на производителя**

Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.

2 Fleminga str.,

03-176 Warsaw

Poland

**Дата на последна редакция**