

ПОДПИСНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Приложение 2	
Към РУ №	II-МЧ6, 10.12.07
7/30, 10.07	
Одобрено.	

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

**SIRACOL
СИРАКОЛ**

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА, ТЪЙ КАТО В НЕЯ СЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС!

Този лекарствен продукт се отпуска без рецепт. Въпреки това Вие трябва да използвате Сиракол внимателно, за да получите най-добри резултати от лечението.

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от повече информация, обърнете се към фармацевт или лекар за съвет.
- Ако въпреки лечението симптомите на заболяването се усилват или остават без промяна, консултирайте се с лекар.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Сиракол и за какво се прилага.
2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Сиракол.
3. Как да прилагате Сиракол.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Сиракол.
6. Друга информация.

Сиракол сироп

Активно вещество в 1 ml сироп: Sulfogaiacol 60.4 mg

Помощни вещества: захароза, етанол, аромат на портокал, оцветител карамел, пречистена вода.

Сиракол сироп се предлага в тъмни стъклени бутилки по 140 ml, придружени с мерителна лъжичка от 5 ml.

Притежател на разрешението за употреба:

"Актавис" ЕАД
бул. "Атанас Дуков" № 29
София, България
Тел: 9321 762

Производител:

"Балканфарма-Троян" АД,
5600 Троян, ул. "Крайречна" № 1, България
Тел. (0670) 62 607; Факс: (0670) 62 610



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИРАКОЛ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Сиракол сироп втечнява бронхиалния секрет при остри и хронични възпалителни заболявания на дихателните пътища и спомага за неговото отстраняване при кашляне. В големи дози предизвиква намаляване на бронхиалния секрет (ако е увеличен) и действа изсушаващо на бронхиалната лигавица. Продуктът има и слабо противовъзпалително действие.

Приложение:

Сиракол се прилага за краткотрайно лечение, при остри и хронични възпалителни заболявания на дихателната система, за втечняване на секрецията и улесняване на нейното отхрачване.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИРАКОЛ

Сиракол не се прилага при:

- Алергия към активното или някое от помощните вещества на продукта;
- Кръвохрак;
- Съществуващ или заплашващ оток на белия дроб.

При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:

Необходимо е да се употребява с повишено внимание при пациенти с язва на стомаха и/или на дванадесетопръстника.

Възможно е повлияване на някои лабораторни тестове.

Приложение на Сиракол и прием на храни и напитки:

Няма данни за необходимост от специален хранителен режим или ограничения на определени видове храни и напитки по време на лечението с този продукт.

Бременност

Преди прием на каквото и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Не се употребява по време на бременност.

Кърмене

Преди прием на каквото и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Не се препоръчва прилагането на Сиракол сироп в периода на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Сиракол може да предизвика замаяност и сънливост, поради което се изиска повишено внимание при използването му от пациенти, на които се налага да шофират или да работят с машини. Да се има предвид наличието в състава му на етилов алкохол.



Важна информация за някои от съставките на Сиракол:

Готовият продукт съдържа етанол. Всяка единична доза (5 ml) съдържа до 0.28 g алкохол, поради което може да представлява опасност за страдащите от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и за бременни жени и деца. Може да промени или засили действието на други лекарствени продукти.

Сиракол сироп съдържа 70.7 g захароза. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка единична доза (5 ml) набавя до 2.5 g захароза. Това го прави неподходящ за прилагане при диабетици. Трябва да се има предвид възможността за влошаване състоянието на пациенти с вродена непоносимост към фруктозата или с глюкозен/галактозен синдром.

Приложение на други лекарствени продукти:

Моля, информирайте своя лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.

Сиракол може да се прилага едновременно с антибиотици, химиотерапевтици, антипиретици и витамини.

Сиракол не бива да се прилага едновременно и до 14 дни след лечение с МАО инхибитори.

При едновременно приложение е възможно засилване на ефекта на някои лекарствени продукти, понижаващи кръвното налягане.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА СИРАКОЛ

Винаги прилагайте Сиракол точно както е посочено в тази листовка!

Възрастни: по 3 мерителни лъжички (15 ml), 2-3 пъти дневно;

Деца от 6 до 14 години: по 1 мерителна лъжичка (5 ml), 2-3 пъти дневно;

При необходимост от продължителност на лечението над 4-5 дни продуктът се прилага по лекарско предписание.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Сиракол е по-сilen от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Ако сте използвали по-голяма доза Сиракол от предписаната:

При прием на по-висока доза от предписаната, веднага се обърнете за помощ към лекар!

При предозиране могат да се наблюдават гадене и повръщане, мускулна слабост, сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.

Лечение – предизвиква се повръщане, прилагат се стомашна промивка и симптоматично лечение.

При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!

Ако сте пропуснали да приложите Сиракол:

Ако сте пропуснали един прием, вземете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както и всеки друг лекарствен продукт, Сиракол може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

При спазване на инструкциите за приложение, съобразяване с предпазните мерки и контраиндикации, Сиракол сироп е с много добра поносимост.

Възможно е да се наблюдава дразнене от страна на stomашно-чревния тракт, което се изразява в гадене и повръщане. В много редки случаи могат да се срещнат парене в устата, гърлото и стомаха.

От страна на нервната система могат да се наблюдават главоболие замайване, сънливост, беспокойство, нервност, нарушение в съня.

При високи дози може да причини мускулна слабост, потискане на сърдечно-съдовата функция с колапсни прояви.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на своя лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

При температура под 25⁰C.

След първото отваряне на опаковката е годен за употреба 30 дни, при спазване на същите условия на съхранение.

Срок на годност: 2 (две) години от датата на производство.

Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД
бул. "Атанас Дуков" № 29
София, България
Тел: 9321 762

Последна актуализация на текста – Ноември, 2007 г.

