

SOLCOSERYL®/СОЛКОСЕРИЛ

Листовка за пациентта

Листовка за пациентта

И А Л
О Д О Б Р Е Н О !
ДАТА 28.06.05г.

SOLCOSERYL®/СОЛКОСЕРИЛ 5 % маз

СЪСТАВ

SOLCOSERYL® 5 % маз

Активно вещество

1 g маз съдържа 50 mg Solcoseryl 120 concentrate (2,07 mg protein-free haemodialysate of blood from veal calves, chemically and biologically standardised, като сухо вещество).

Помощни вещества

Метил паракидроксибензоат (E218), пропил паракидроксибензоат (E216), бял вазелин, цетилов алкохол, холестерол, вода за инжекции.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

1 туба с 20 g маз, в картонена кутия.

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО
ЗА УПОТРЕБА**

АЛКАЛОИД АД - Скопие
Бул. Александър Македонски 12
1000 Скопие, Република Македония
Македония

ПРОИЗВОДИТЕЛ

АЛКАЛОИД АД - Скопие
Бул. Александър Македонски 12
1000 Скопие, Република

по лиценз:
ICN Pharmaceuticals Switzerland
Ltd., Birsfelden, Switzerland.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА

Солкосерил е активатор на клетъчното дишане, който увеличава консумацията на кислород в тъканите с повече от 200%, подобрява метаболизма, подпомага тъканината регенерация, предотвратява или намалява вторичните дегенерационни и патохистологични промени в обратимо увредени клетъчни системи, подобрява синтеза на колаген и стимулира клетъчната миграция и пролиферация.

май, 2005
ЦВ



SOLCOSERYL®/СОЛКОСЕРИЛ

Листовка за пациентта

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- Рани
- Варикозни язви
- Първа и втора степен на изгаряне
- Декубитални язви, язви при рентгеново облъчване
- Кожни трансплантиации

**ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА УПОТРЕБАТА
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните или някое от помощните в-ва.

Специални предпазни мерки при употреба

При употреба в съответствие с инструкцията не се налагат специални предпазни мерки.

Лекарствени и други форми на взаимодействия

Не се съобщава за взаимодействия с други медикаменти.

Специални предупреждения

Няма противопоказания за употребата на Солкосерил-маз и гел в периода на лактацията.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА

Дозировка и начин на приложение

Солкосерил-гел се използва за първично третиране на всяка вид улцерации и тежки изгаряния. Нанася се два пъти дневно върху раната.

Когато се появят гранулации, се преминава към нанасяне на солкосерил- маз два пъти дневно до постигане на пълна епителизация.

По-леки форми на трофични изменения могат да се третират локално, докато за лечение на трофични увреждания на кожата и меките тъкани е необходимо комбинирано локално и парентерално приложение на солкосерил. В случай на гнойни улцерации се препоръчват влажни компреси (с борна киселина, разтвор на Дакин и т.н.) преди започване на лечението. Ако е необходимо може да се предпише антибиотична терапия, въпреки че, добавянето на антибиотици към солкосерил гел или маз не се препоръчва.

Предозиране

Не е съобщавано за последствия от предозиране на Солкосерил-маз.

май, 2005

ЦВ



SOLCOSERYL®/СОЛКОСЕРИЛ

Листовка за пациента

Ако е пропуснат един прием

Пропуснато намазване не води до проблеми.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Много рядко могат да възникнат алергични реакции. В такъв случай терапията трябва да се прекрати.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 30°C.

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЕСТА, НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА!

СРОК НА ГОДНОСТ

Пет (5) години.

Да не се използва след изтичане на срока на годност, означен върху опаковката.

Без лекарско предписание.

ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

май, 2005

май, 2005
ЦВ

