

29. 06. 04г.
14.

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 29.06.04г.

ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТИ

Преди да използвате лекарството, прочетете информацията по-долу.

STRUCTUM 500 mg СТРУКТУМ 500 mg

Капсули

Състав

Активно вещество:

Натриев хондроитин сулфат (Sodium Chondroitin Sulphate).....500 mg

Помощни вещества: талк

Състав на капсулата: желатин, титаниев диоксид, индиготин.

Фармакологични ефекти

Това е антиостеоартритен лекарствен продукт. Хондроитин сулфатната киселина е важен компонент на основното вещество на костта и на хрущяла.

Показания

Симптоматично лечение (със забавено действие) на функционални прояви и болка при остеоартроза.

Противопоказания

Лекарственият продукт да не се използва при:

- данни за алергия спрямо някоя съставка на продукта;
- деца под 15 годишна възраст.

Специални предупреждения

Приложението на лекарствения продукт не се препоръчва при бременно или при кърмене (вижте раздела бременност и кърмене).

Бременност и кърмене

Приложението на този лекарствен продукт по време на бременност и кърмене е непрепоръчително, освен ако е назначен от вашия лекуващ лекар. Ако установите по време на лечебния курс, че сте бременна, е наложително да се консултирате с лекуващия ви лекар. Само личният ви лекар може да адаптира лечебния курс спрямо състоянието ви.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма



Взаимодействия

Няма

Дозировка и начин на употреба

Да се прилага само при възрастни (над 15 годишна възраст).

За перорална употреба.

Капсулите да се приемат цели с голяма чаша вода.

1 капсула от 500 mg два пъти дневно (1 g дневно).

При липса на ефект се консултирайте с лекуващия лекар.

Предозиране

Ако сте взел Structum 500 mg в доза по-голяма от препоръчваната, веднага се консултирайте с личния ви лекар.

Ако сте изпуснал последния прием на Structum 500 mg, не удвоявайте следващата доза за компенсация на пропуснатата.

Нежелани реакции

- Кожни реакции: съобщени са случаите на зачервяване, възпаление на кожата, обрив с или без сърбеж и/или оток, уртикария (копривна треска).

При тези случаи спрете лечението и съобщете на лекуващия ви лекар.

- Стомашно-чревни реакции: редки случаи на гадене, повръщане.
При тези случаи съобщете на лекуващия ви лекар.

Опаковка

Кутии от 60 капсули в блистери (ПВХ – ПВДХ / Алу – ПВДХ)

Начин на отпускане

Без рецептa

Срок на годност

2 години

Условия за съхранение

Да се съхранява на сухо и недостъпно за деца място, при температура под 25 °C.

Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба

Притежател: PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, place Abel Gance
92654 Boulogne Cedex
France



Производител: PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Rue du Lycee, ZI de Cuiry 45502 GIEN
France

Дата на актуализация на текста

Януари 2001

*Преди използване, проверете срока на годност изписан върху опаковката.
Да не се използва след посочената дата.*

