

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА08.02.05.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

TELFAST 30 mg

ТЕЛФАСТ 30 mg

Fexofenadine hydrochloride

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди Вашето дете да започне да взима това лекарство. Ако не сте сигури в нещо или имате въпроси, обърнете се към Вашия фармацевт или лекар.

Какво представлява лекарството на Вашето дете ?

Лекарството на Вашето дете е Телфаст 30mg филмирани таблетки. Всяка таблетка съдържа 30 mg активно вещество fexofenadine hydrochloride. Тези таблетки съдържат също помощните вещества: микрокристална целулоза, прешелатинирано нишесте, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат, хипромелоза, повидоне, титаниев диоксид (Е 171), колоидал анхидро силика, мацрогол 400, розов и жълт железен окис (Е 172). Всяка опаковка съдържа 50 кръгли таблетки с прасковен цвят.

Какво трябва да знаете за Телфаст 30 mg филмирани таблетки ?

Фексофенадин хидрохлорид е антихистамин и е активното вещество в Телфаст 30 mg таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

Aventis Pharma Deutschland GmbH

D – 65926 Frankfurt am Main – Germany

Производител

Aventis Pharma S.P.A., SS17 Km 22 Scopito – Italy

За какво е предназначен Телфаст 30 mg ?

Телфаст 30 mg филмирани таблетки съдържат fexofenadine hydrochloride, който е антихистамин. Антихистамините облекчават симптомите като кихане, сърбеж в носа, хрема, зачервени и сълзящи очи, сърбеж по небцето, запущен нос, които съпътстват сennата хрема (сезонен алергичен ринит).

Кога Вашето дете не трябва да използва Телфаст 30 mg таблетки ?

Вашето дете не трябва да взима това лекарство, ако има непоносимост към активното вещество или към някое от помощните вещества (виж "Какво представлява лекарството на Вашето дете ?")

*Стглажда с предимаштвия
коригирана мяка
12.03.2005*

М.М.



Шофиране и работа с машини

Изпитванията показват, че Телфаст 30 mg не предизвиква сънливост. Въпреки това Вие трябва да се убедите, че Вашето дете не е повлияно при приемането на Телфаст 30 mg и може да се концентрира, когато то реши да кара колело или скейтборд.

Приемане на лекарството

Приемайте таблетките с вода. Вашето дете може да ги приема с или без храна. Ако Вашето дете използва лекарство за лошо храносмилане, което съдържа алуминий или магнезий, се препоръчва да предвидите около два часа между времето, в което се взема Телфаст 30 mg и другото лекарство. Това се прави, за да не се повлияе действието на Телфаст 30 mg, като се понижи количеството на резорбираното лекарство.

Деца на възраст от 6 до 11 години:

Вземат по 1 таблетка 30 mg два пъти дневно

Деца под 6 години не трябва да вземат Телфаст 30 mg таблетки.

При възрастни, които имат проблеми с черния дроб и бъбреците не е необходимо промяна на дозата на Телфаст таблетки. При деца, които имат проблеми с черния дроб и бъбреците не е установено дали Телфаст таблетки са безвредни и ефективни, поради това, ако детето Ви има такива проблеми, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако Вашето дете е пропуснало един прием, направете така, че да приеме пропуснатата доза колкото е възможно с по-голям интервал от следващата доза. Никога не взимайте двойна доза, поради това, че сте пропуснали една.

Ако Вашето дете инцидентно е приело повече таблетки, обърнете се към Вашия доктор или незабавно идете в най-близката болница.

След приема на лекарството

По време на контролирани клинични проучвания най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции на Телфаст 30 mg таблетки са главоболие, замайване, умора/сънливост и гадене, смущения в съня, лоши сънища или неврози, но те са наблюдавани в същата степен и при приемане на плацебо таблетки.

Други наблюдавани нежелани лекарствени реакции са алергични кожни реакции, като обрив и сърбеж. Много рядко се появяват стягане в гърдите или хрипове, неочеквано подуване и зачервяване на кожата.

Ако в хода на лечението на детето Ви с Telfast таблетки се появят някои от описаните нежелани лекарствени реакции, трябва да преустановите употребата на таблетките и да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.



Съхранение на лекарството

Не употребявайте Вашето лекарство след изтичане срока на годност, изписан върху опаковката.

Съхранявайте лекарството на места, недостъпни за деца.

Дата на последна редакция – януари 2005

