



ПРОЕКТО ЛИСТОВКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ

ТОРОСИН 5 g.

powder cutaneous

ТОПОЦИН 5 гр.

дермален прах

СЪСТАВ : за 1.0 g.

Neomycin sulfate - 3500 UI

Zinc bacitracin - 250 UI

Aerosil 200 - 1 mg.

Lactose monohydrate to 1 g.

СВОЙСТВА И ФАРМАКОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ

Топоцин дермален прах е комбиниран продукт за локално приложение с изразено антибактериално действие.

Неомицинът е аминогликозиден антибиотик с широк спектър на

бактерицидно действие спрямо Грам (+) и Грам (-) бактериални

микроорганизми. Той възпрепятства синтеза на белтък в бактериалните

клетки.



Цинк бацитрацинът е смес от полипептидни антибиотици с бактерицидно действие спрямо Грам (+) бактерии. Бацитрацинът нарушава синтеза на клетъчната стена и синтеза на белтък в бактериалната клетка.

В комбинацията неомидин и бацитрацин притежават синергично действие, разширяват взаимно антибактериалния си спектър и възпрепятстват развитието на бактериална резистентност. Не се инактивират при контакт с биологични течности и секрети.

ПОКАЗАНИЯ :

За лечение на локални инфекции причинени от микроорганизми чувствителни спрямо Топоцин : инфектирани рани и изгаряния, пиодермии, импетиго, фоликулит, фурункулоза, инфектирани екземи и улкус крурис.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ :

При установена свръхчувствителност към неомидин и цинк бацитрацин.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ :

Възможно е развитие на контактни алергични екземи; при продължителна употреба е възможна появата на периулцерозни дерматити; сенсibiliзацията при употреба върху кожа може да компрометира системната употреба на съответните антибиотици или на други, принадлежащи към същата група (например : аминогликозиди)



ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ :

Несъвместимо е комбинирането на продукта със салицилова киселина, танини и тежки метали.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА :

Системната резорбция на антибиотиците (Неомицин сулфат и Цинк бацитрацин) е възможна, ако се третираат големи кожни участъци. Това е от особена важност, когато се касае за кърмачета.

Не се препоръчва много продължителна употреба (пример : над 8 дни), поради риск от селекция на резистентни бактерии и свръхинфекция.

Не се препоръчва употребата върху кървящи кожни участъци, поради риск от системна резорбция.

БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ :

Топоцин не трябва да се прилага в големи количества и за продължителен период от време при бременни и кърмачки. Не бива да се използва за лечение на инфектирани рагади на млечни жлези при кърмещи жени, защото кърмачето ще ги погълне.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ :

Определя се от лекар. Прилага се локално, 2-3 пъти дневно. Продуктът се нанася равномерно върху засегнатите кожни участъци. Препоръчаната продължителност на лечението е около 4 до 8 дни.



СЪХРАНЕНИЕ :

В сухи складови помещения , защитени от пряка слънчева светлина при температура под 25°C.

СРОК НА ГОДНОСТ :

Две години от датата на производство. Продуктът не бива да се употребява след изтичане на срока на годност.

Да се пази далеч от достъп на деца !

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ :

“ ЗАВЕТ” – АД, гр. Завет обл. Разградска

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ :

“ ТАЛОДЕРМА “ – ООД гр. Варна обл. Варненска

ДАТА, НА КОЯТО ЛИСТОВКАТА Е РЕДАКТИРАНА ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ – януари 2005 година.

