



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

TROXEVASIN®

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако се нуждаеме от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 6-7 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани ефекти, моля уведомете вашия лекар или фармацевт.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Троксевазин и за какво се прилага.
2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Троксевазин.
3. Как да прилагате Троксевазин.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Троксевазин.
6. Друга информация.

Троксевазин® 2% гел

Troxerutin

Активно вещество в 1 g гел: Troxerutin 20 mg

Помощни вещества: карбомер, динатриев едетат, бензалкониев хлорид, троламин, пречистена вода.

Продуктът се предлага в алуминиева туба, съдържаща 40 g Troxevasin gel 2%, в единична картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба

"Актавис" ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2

гр. София, България

Производител

"Балканфарма Троян" АД,
ул. "Крайречна" №1,
5600 Троян, България
Tel. +(359 670) 62 607



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРОКСЕВАЗИН И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Основната съставка на Троксевазин гел е Троксерутин. Той тонизира стените на съдовете и намалява повишената им пропускливост. Действа противовъзпалително върху околосъдовата тъкан. По този начин намалява отока, подобрява съдовото хранене при различни болестни промени, свързани с венозната недостатъчност.

Троксевазин има следните приложения:

Облекчаване на отока и свързаните с хроничната венозна недостатъчност (ХВН) симптоми като болка, тежки крака, както и болка след склеротерапия.

Облекчаване на болка и оток от травматичен произход като изкълчване или мускулна контузия.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТРОКСЕВАЗИН

Троксевазин не се прилага при алергия към активното вещество или някой от другите компоненти на продукта.

Приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:

Троксевазин гел не трябва да се нанася върху лигавици, открити рани и екземи.

Приложение на Троксевазин и прием на храни и напитки:

Няма ограничения относно приложението на продукта и приема на храни и напитки.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото при използване на продукта.

Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото при използване на продукта.

Шофиране и работа с машини

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Приложение на други лекарствени продукти:

Моля, информирайте своя лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти; дори ако те не са Ви били предписани от лекар.

Няма данни за установени лекарствени взаимодействия на Троксевазин.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ТРОКСЕВАЗИН

Винаги прилагайте Троксевазин точно както е посочено в тази листовка!

Засегнатият участък се намазва сутрин и вечер с необходимото количество гел. Втрува се с леки, масажиращи движения до пълно резорбиране на продукта. Не оставя миризма и мазни петна по бельото.

При по-тежки случаи се препоръчва комбинирана терапия с Троксевазин капсули.



Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Троксевазин е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Ако сте използвали по-голяма доза Троксевазин

Не са наблюдавани случаи на предозиране. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо да се приложат общи мерки за извеждане от организма (средства, предизвикващи повръщане) и прилагане на симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приложите Троксевазин

Ако сте пропуснали един прием, приложете продукта във времето на следващия регулярен прием без да увеличавате дозата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както и всеки друг лекарствен продукт, Троксевазин може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

След прилагане на Троксевазин гел много рядко се наблюдават реакции на кожно дразнение - зачеряване, сърбеж, кожни обриви. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на своя лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

При температура под 25°C.

Да не се употребява след изтичане срока, указан на опаковката!

Да не се замразява!

Срок на годност: 5(пет) години от датата на производство.

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 6 (шест) месеца

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2

гр. София, България

Последна актуализация на текста - Март 2007 г.

