

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА



Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Пазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново;
- Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт;
- Това лекарство е предписано само на Вас и Вие не трябва да го предоставяте на други. То може да им навреди, дори и да имат оплаквания, подобни на Вашите.

В тази листовка ще намерите:

1. Какво представлява Viregyt-K и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемате Viregyt-K
3. Как да приемате Viregyt-K
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на лекарствения продукт

Viregyt-K® 100 mg capsules **Вирегит-К 100 mg капсули**

Всяка капсула Viregyt-K съдържа 100 mg amantadine hydrochloride като лекарствено вещество.

Като помощни вещества се съдържат:
магнезиев стеарат
лактоза монохидрат

Твърдата капсулна обвивка съдържа:
Ариавит Хинолин жълто (Е 104)
Ариавит Индигокармин (Е 132)
Титаниев диоксид (Е 171)
Желатин

Производител и притежател на разрешението за употреба:

EGIS PHARMACEUTICALS LTD.
1106 BUDAPEST
Kereszturi ut 30-38.
HUNGARY
Phone: (36-1) 265 5555
Fax: (36-1) 265 5529



1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIREGYT-K И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Viregyt-K е противовирусно лекарство, използвано за предпазване от и лечение на инфекции на дихателните пътища причинени от грипен вирус тип А. Използва се също и за лечение на пациенти с Паркинсонизъм с различен произход.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ VIREGYT-K

Не вземайте този лекарствен продукт ако:

- сте имали алергична реакция към лекарственото или към някое от помощните вещества;
- сте бременна или кърмите.

По-специално внимание трябва да се обърне на:

Задайте си следните въпроси преди да започнете да приемате лекарството:

- Страдате ли от епилепсия (дали сте имали някога припадък);
- Страдате ли от сърдечна слабост, ниско кръвно налягане или отоци в карайниците;
- Страдате ли от депресия (дали сте правили опит за самоубийство);
- Страдате ли от екзема;
- Страдате ли от стомашна язва (или сте страдали в миналото);
- Страдате ли от чернодробно заболяване.

Използването на капсулите не се препоръчва при деца под 5 години!

Това лекарство се предписва с особено внимание при пациенти с психични заболявания и не бива да бъде комбинирано с карбидопа и леводопа при тях.

Всяка капсула съдържа 98 mg лактоза. Уверете се, че нямате непоносимост към млечната захар.

Ако сте със заболяване, което значително уврежда функцията на бъбрека, Вашият лекар може да предприше някои изследвания преди да започне лечението. По този начин той ще определи подходящата за Вас доза.

Възможна е обратима промяна на нивата на чернодробните ензими по време на лечението, особено при пациенти с чернодробно заболяване или екзема в миналото.

Пациенти с болестта на Паркинсон не бива да преустановяват лечението внезапно, защото е наблюдавана паркинсонова криза при такова рязко прекратяване.

След като лекарството Ви е било предписано, Вашият лекар може редовно да назначава изследвания, за да оценява лечебния ефект и да предприше най-подходящата доза. Понякога той може да спре лечението за няколко седмици, след което да го започне отново.



Приемане на лекарството с храни и напитки

По време на лечението с Viregyt-K употребата на алкохол е забранена.

Бременност и кърмене

Не приемайте Viregyt-K, ако сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Приемането на това лекарство може да доведе до липса на концентрация за извършване на горните.

НЕ шофирайте и НЕ работете с машини по време на лечението.

Приемане на други лекарства

Информирайте Вашия лекар, ако приемате друго лекарство.

За лекарства като антихолинергични, антидепресанти, антидискинетични, антихистамини, фенотиазини – уведомете Вашия лекар.

Понякога за лечение на Паркинсонизъм могат да бъдат предписани и други лекарства (напр. карбидопа -леводопа) заедно с този лекарствен продукт.

Използването на amantadine заедно със стимуланти на централната нервна система увеличава нейната възбуда (нервност, тревожност, безсъние, увеличен риск от припадъци) и/или риска от неритмична сърдечна дейност.

Едновременното приложение на Viregyt-K с хидрохлоротиазид и/или калий-съхраняващи диуретици намалява отделянето на лекарството през бъбреците, което може да доведе до повишени нива в кръвта и увеличена токсичност.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ VIREGYT-K

Вашият лекар ще предпише как да приемате лекарствения продукт. Стриктно следвайте инструкциите му.

Грип А вирусна инфекция:

Възрастни и деца над 12 год.: обичайната доза е 2 x 1 капсула дневно.

При пациенти над 65 годишна възраст се препоръчва по 1 капсула дневно.

Тази доза е подходяща за лечение или предпазване от заболяване.

Деца:

При възраст между 5 и 9 години се препоръчва дневна доза от 1 капсула.

Дозата при деца между 9 и 12 години: 1 капсула 1 – 2 пъти дневно в зависимост от телесното тегло на детето и тежестта на заболяването.

Вашият лекар ще предпише колко точно капсули да давате на Вашето дете. Стриктно следвайте инструкциите му.

За лечение на Паркинсонизъм:

Началната дневна доза е 100 mg (1 капсула) в продължение на 4 до 7 дни,



максимално 15 дни.

Поддържаща доза: 100 mg два пъти дневно (2 x 1 капсула).

Максимална дневна доза: 300 mg (3 капсули).

При започване на лечението отново (след евентуалното му спиране) Вашия лекар може да увеличава дозата постепенно за да осигури ефективност и да избегне токсични ефекти.

Общи положения:

Добре е предпазното третиране да започне преди или непосредствено след контакта с болен и да продължи поне 10 дни. Приемът на капсулите след ваксинация трябва да бъде 2 – 3 седмици докато се изработи имунитет, а в случаите когато ваксинацията е невъзможна или противопоказана се препоръчва лечението с Viregyt-K да продължи 6 седмици за осигуряване на защита от заразяване.

Лечението на грип А вирусната инфекция е добре да се започне до 24 – 48 часа след появата на първите симптоми и да продължи 4 – 5 дни като подобрение се наблюдава 1 – 2 дни след това.

Пациенти с увредена бъбречна функция:

Преди да бъде предписан лекарственият продукт на пациенти с увредена бъбречна функция е необходимо да се извършват някои изследвания. Началната доза обикновено е 200 mg, а следващите се определят по следната схема:

Креатининов клирънс (ml/min.)	Дози и дозов интервал
> 75	2 x 100 mg/дн.
35 – 75	1 x 100 mg/дн.
25 – 35	100 mg през ден
15 – 25	100 mg през 2 дни
< 15 и тези на хемодиализа	100 mg седмично

Много е важно да следвате инструкциите на Вашия лекар, докато приемате това лекарство.

Ако сте приели повече Viregyt-K капсули, отколкото Ви е предписано

Ако сте приели повече капсули, отколкото Ви е предписано или ако считате, че някой друг е приел от лекарството незабавно се отнесете до най-близкото звено за спешна помощ. Вземете всички останали капсули, които са останали заедно с тази листовка за да ги покажете на лекаря.

Признаци на предозиране: гърчове, халюцинации, увеличена двигателна активност, аритмия.

Необходимо е да се приложат общо укрепващи мерки. Препоръчват се и лекарства за подкиселяване на урината, което увеличава отделянето на amantadine.

Ако сте пропуснали прием на Viregyt-K капсули

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатия прием, поради риска от предозиране.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Може да поувствате неразположение, замаяност и да се появят нарушения в съня.

По-рядко може да изпитате потиснато настроение, тревожност или безпокойство, халюцинации, обърканост, безапетитие, сухота в устата, запек, нестабилна походка, петна по кожата, отоци в крайниците, ниско кръвно налягане при изправено положение, главоболие.

Още по-рядко може да се появят застойна сърдечна недостатъчност, психически нарушения, задръжка на урина или изпускане, задух, уморяемост, обриви, повръщане, слабост, неясен говор, зрителни нарушения, сърцебиене, повишени нива на чернодробните ензими. Много рядко - гърчове, намален брой на белите кръвни клетки, екзема, пристъпи на кръгови движения на очите, чувствителност към светлина, увеличена чувствителност на роговицата.

Ако се прояви някаква друга нежелана лекарствена реакция, която не е спомената в тази листовка моля информирайте Вашия лекар!

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Съхранявайте на недостъпно за деца място!

Да се съхранява при температура под 30°C

Не бива да използвате лекарствения продукт след изтичане срокът на годност, който е отпечатан върху опаковката.

Тази листовка е осъвременена:

Август 2005 г.

