

Приложение 2

Листовка за пациента

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА ...25.02.03.

Листовка за пациента

VIROLEX®/ ВИРОЛЕКС® (Aciclovir) крем 5%

Състав

1 g крем съдържа 50 mg ацикловир.

Помощи вещества: полоксамер, цетостеарилов алкохол, натриев лаурил сулфат, бял мек парафин, течен парафин, прогиплен гликол, дестилирана вода.

Свойства и действие

Ацикловир е противовирусно средство с локално и системно действие и вирусостатична активност (потискаща развитието на вируса). Той е ефективен срещу Херпес симплекс вирус тип 1 и 2 (HSV-1 и HSV-2) и Варицела зoster вирус (VZV). Той инхибира синтезата на ДНК без да засяга нормалните клетъчни процеси.

Показания

Използва се за лечение на херпес на устните, причинен от херпес симплекс вирус.

Противопоказания

Не трябва да се прилага при пациенти, свръхчувствителни към ацикловир или къмнякоя от помощните съставки.

Предупреждения

Virolex крем не трябва да се прилага върху лигавиците на устата, очите или влагалището, тъй като може да има дразнещ ефект. При пациенти със силно намалени защитни сили се препоръчва приложение на виролекс под формата на таблетки.

Бременност и кърмене

Ако сте бремени или кърмите, уведомете лекуващия лекар преди да започнете да прилагате Virolex крем.

Употребата му не се препоръчва по време на бременност, въпреки че предклиничните изследвания не показват тератогенен и ембриотоксичен (увреждащ плода) ефект. Може да се прилага само при живото-застрашаващи инфекции, когато потенциалната полза за майката надвишава потенциалния рисък за плода.

Ацикловир се екскретира в кърмата, поради което не се препоръчва за употреба на кърмачки.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Лекарството не влияе на способността за шофиране и работа с машини.

Лекарствени и други взаимодействия

Няма съобщения за взаимодействия при локално приложение на ацикловир.

Дозировка и начин на приложение

Ако Вашият лекар не ви е предписал друго, спазвайте следните инструкции!

Много важно е пациентът да започне употребата на ацикловир колкото е възможно по-скоро, веднага щом се появят първите признаци (продромална фаза).

Кремът се прилага върху засегнатия участък 5 пъти дневно, в интервали от 4 часа.

Лечението продължава 5 дни, а в по-тежки случаи до 10 дни.

Предозиране

Не се съобщава за предозиране с Virolex крем. Дори погълдането на голямо количество крем не би предизвикало клинична картина на интоксикация. Независимо от това, незабавно се консултирайте с лекуващия лекар в случай на прилагане на по-големо количество от продукта.

Нежелани лекарствени реакции

Може да се получи леко усещане за парене в мястото на приложение.

По-рядко се наблюдава зачеряване, изсушаване и излющване на кожата, сърбеж. Възможни са алергични реакции

Вие трябва да бъдете предупредени от Вашия лекар за възможността от поява на нежелани реакции и да знаете какво да правите в такъв случай.

Ако наблюдавате нежелани реакции или се съмнявате, че имате такива, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Съхранение и срок на годност

Лекарството не трябва да се употребява след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Да се съхранява при температура от 8 до 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Начин на отпускане

Само по лекарско предписание.

Опаковка

5 g крем

Производител

KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia, с активна съставка произведена от Glaxo SmithKline.

Дата на последна ревизия

25 септември 1998 год.