

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ZENTEL™ 200 mg film-coated tablets
ЗЕНТЕЛ™ 200 mg филмирани таблетки

албендазол (albendazole)

ИЗДАВАТЕЛ: ...
Листовка - Приложение 2
Към РУ №: 11-3498 / 13.11.08
Одобрено: 21 / 29.07.08

Тази листовка се отнася само за ZENTEL. Тя ви информира за най-важното относно лекарството. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. За повече информация или съвет се обърнете към лекаря.

Какво представлява и какво съдържа лекарството

Вашето лекарство се нарича ZENTEL и представлява филмирани таблетки. Всяка таблетка съдържа 200 mg от активното вещество albendazole (албендазол).

Таблетките съдържат и следните помощни вещества:

- сърцевина на таблетката - лактоза, царевично нишесте, поливидон, натриев лаурилсулфат, натриев нишестен гликолат, микрокристална целулоза, захарин натрий, магнезиев стеарат и есенция;
- филмово покритие - метилхидроксипропилцелулоза и пропиленгликол.

В една опаковка ZENTEL се съдържат 2 таблетки в блистер.

Кой произвежда ZENTEL и притежава разрешение за употребата му в България

ZENTEL се произвежда от GlaxoWellcome Production, Terras 1, ZI du Terras, 53100 Mayenne, Франция. Притежател на разрешението за употребата е SmithKline Beecham plc., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Великобритания, представяван в България от GlaxoSmithKline ЕООД с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 10.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ZENTEL

ZENTEL принадлежи към групата на бензимидазол карбаматите с антихелминтно и антипаразитно действие. Използва се за лечение на голям брой заболявания, причинени от паразити.

ZENTEL е ефикасен срещу острици, кръгли червеи, трихурис трихиурия, тении, анкилостоми и др. ZENTEL отстранява паразитите от тялото ви. Счита се, че това става като ги убива.

Лекарството действа срещу яйцата, ларвите и възрастните паразити.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА ZENTEL

Не трябва да приемате лекарството в случай, че:

- Имате алергия към албендазол или някоя от останалите съставки на ZENTEL.
- Сте бременна или подозирате, че сте бременна.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

ZENTEL може да доведе до покачване на нивата на чернодробните ензими в кръвта. При спиране на лечението ензимите се нормализират. Вашият лекар може да Ви назначи изследване на черния дроб преди и по време на лечението.

Бременност

Преди да започнете приема на лекарството, моля, уведомете Вашия лекар:

- ако планирате да забременеете
- ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна
- ако кърмите.

Не приемайте ZENTEL по време на бременност. При жени в детеродна възраст лечението може да започне през първата седмица след края на менструацията или след отрицателен тест за бременност. Уведомете лекаря си, ако забременеете, докато се лекувате със ZENTEL.

Ако не сте сигурни дали сте бременна, лекарят може да Ви препоръча да направите тест за бременност.



Забременяването трябва да се избягва (чрез използване на ефикасни предпазни мерки срещу забременяване) по време на приема на лекарството и за 1 месец след приключване на лечението.

Кърмене

Уведомете лекаря, ако кърмите или планирате да кърмите бебето си. Лекарят ще реши дали това лекарство е подходящо за вас.

Прием на ZENTEL с храна и напитки

Можете да приемате таблетките ZENTEL след или по време на хранене, както и на гладно.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

ZENTEL не повлиява способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това се изисква повишено внимание при шофиране и работа с машини в началото на приема на лекарството.

Взаимодействия с други лекарства

По време на лечението със ZENTEL може да продължите приема на други лекарства, с изключение на празиквантел.

Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами без лекарско предписание.

КАК СЕ ПРИЕМА ZENTEL

Важно е да приемате лекарството точно както лекарят Ви е предписал. Ако не сте сигурни в нещо, посъветвайте се с него. Лекарят определя дозировката и продължителността на лечението. Дозировката зависи от възрастта или телесното Ви тегло, както и от вида и тежестта на инфекцията.

Ако лекарят не е предписал друго, обичайната дозировка на лекарството е:

Възрастни и деца над 2 години:

Две таблетки ZENTEL веднъж дневно за три последователни дни.

Деца от 1 до 2 години:

Една таблетка ZENTEL веднъж дневно.

В зависимост от състоянието ви лекарят може да ви предпише друга доза. Трябва да завършите целия курс на лечение и да не спирате приема на лекарството, дори ако се чувствате по-добре.

Ако смятате, че ефектът на лекарството е прекалено слаб или прекалено силен, не променяйте дозировката сами, а се консултирайте с Вашия лекар.

Някои хора, особено малки деца, може да изпитват затруднение при преглъщане на таблетките. В тези случаи таблетките може да се сдъвчат с малко вода или да се чупят.

Следвайте указанията на лекаря относно приема на лекарството, в противен случай е възможно да не се изяви пълният ефект на лекарството. Добре е да приемате ZENTEL по едно и също време всеки ден.

Може да се наложи лекарят да ви прегледа две или три седмици след приема на предписаната доза или курс. Това се налага, за да се провери дали лекарството е подействало. Понякога може да се наложи прием на втора доза или курс на лечение със Zentel.

Не приемайте повече таблетки, отколкото лекарят ви е предписал.

Какво да направите в случай, че приемете повече от предписаното

Ако сте приели прекалено висока доза ZENTEL или ако някой друг от обкръжението ви е погълнал лекарството по невнимание, незабавно уведомете лекуващия лекар.

Малко вероятно е предозирането на ZENTEL да предизвика някакъв сериозен проблем.

Какво да направите в случай, че пропуснете прием

Ако сте пропуснали приема на някоя доза, приемете лекарството, когато е възможно по-бързо след като се сетите. Приемете следващата доза в обичайното време и не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.



ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всяко друго лекарство, ZENTEL може да причини нежелани реакции. Повечето от нежеланите реакции, които се свързват с приема на ZENTEL, са леки и обикновено изчезват без да се налага спиране на лечението. Някои нежелани реакции може да наложат медицинско лечение.

Уведомете лекаря си, ако след прием на лекарството се появи някой от следните симптоми:

- Главоболие или световъртеж,
- Гадене, повръщане, стомашни болки или диария,
- Сърбеж.

ZENTEL може да доведе до повишаване на нивата на чернодробните ензими в кръвта. В случай че на Вас/на детето Ви ще се прави кръвно изследване, моля, уведомете Вашия лекар за лечението със ZENTEL.

При поява на някоя от следните реакции, спрете приема на ZENTEL и незабавно потърсете лекарска помощ:

- Подуване на крайниците, лицето, устните или гърлото,
- Задух или затруднение в дишането,
- Тежък кожен обрив (разпространяващ се по цялото тяло и/или с образуване на мехури по кожата, устата или клепачите на очите).

Това са симптоми на тежка алергична реакция. Алергичните реакции към ZENTEL са редки.

Ако по време на приема на лекарството забележите други нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, уведомете лекуващия лекар.

СЪХРАНЕНИЕ НА ZENTEL

Таблетките ZENTEL трябва да се съхраняват при температура под 25°C.

Съхранявайте ZENTEL в оригиналната опаковка. Да са пази от пряка светлина.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.

Не използвайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

ZENTEL е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline Group of companies.

Дата на последна редакция на листовката:

