

ИЗПЪЛНИЛА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към РУ №: 2306, 18.06.08	
Одобрено: 18/03/08.08	

Информация за пациента.

Моля, прочетете внимателно!

ZODAK® film-coated tablets 10 mg

ЗОДАК филмирани таблетки 10 mg

Cetirizine dihydrochloride/цетиризинов дихидрохлорид

Прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна информация за вас.

Този медикамент се отпуска без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 годишна възраст. Независимо от това Вие трябва да употребявате ЗОДАК внимателно за да получите желания резултат.


- Запазете тази листовка. Може да се наложи да е прочетете отново.
- Ако имате ако се нуждаете от повече информация или съвет, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт
- Свържете с Вашия лекар ако вашите симптоми се влошат или не се подобрят след 7 дни употреба.
- Ако някоя от нежеланите реакции се задълбочи или ако забележите нежелана реакция, неупомената в тази листовка, моля, свържете се с вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е ЗОДАК и за какво се прилага
2. Преди да използвате ЗОДАК
3. Как да се употребява ЗОДАК
4. Възможни нежелани странични ефекти
5. Как да се съхранява ЗОДАК
6. Допълнителна информация

1. КАКВО Е ЗОДАК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Цетиризин, активната съставка на ЗОДАК, е високо ефективен антихистамин и антиалергично средство с много ниска честота на проявите на сомнолентност (сънливост) след прилагане на обичайната терапевтична доза. Цетиризин потиска както "ранната" фаза на алергичната реакция, опосредствена чрез хистамина и придвижването на възпалителните клетки, по-специално на еозинофилите, така и освобождаването на медиаторите свързани с "късната" фаза на алергичната реакция. Поради удълженото си действие цетиризин може да се прилага един път дневно както при възрастни така и при деца.



ЗОДАК се използва за лечение на целогодишни алергични ринити, сезонни алергични ринити и алергични конюнктивити (сенна хрема), сърбеж, копривна треска при възрастни и деца над 6 години (за деца до 6 години са предназначени ЗОДАК сироп и ЗОДАК капки).

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗОДАК

Не вземайте ЗОДАК :

- ако имате свръхчувствителност към цетиризин или към някой от другите съставки на медикамента
- ако някога се имали алергия към хидроксизин (антиалергичен и антистрес медикамент)
- ако имате тежко бъбречно заболяване
- ако кърмите

Бъдете особено внимателни с ЗОДАК

Не се препоръчва приемането на прекомерно количество алкохолни напитки по време на приема на медикамента.

Прием на други лекарства

Не са описани до сега значими лекарствени взаимодействия.

Прием на ЗОДАК с храна и напитки

Таблетките трябва да бъдат поглъщани с чаша вода.

Бременност и кърмене

Попитайте вашия лекар или фармацевт за съвет преди да приемете какъвто и да е медикамент.

Бременни жени могат да използват ЗОДАК само след лекарска препоръка.

Тъй като ЗОДАК преминава в майчиното мляко, той не трябва да се използа от кърмещи майки.

Шофирате и работа с машини

По-новите антихистамини, какъвто е цетиризин, се свързват с по-ниска честота на прояви на сомнолентност (съниливост), отколкото по-старите антихистамини. Въпреки това, не трябва да превишавате препоръчваната дневна доза, ако възнамерявате да шофирате или работите с машини.



Важна информация за някои от помощните вещества на ЗОДАК

Лекарственият продукт съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗОДАК

Ако не се налага друго, препоръчваната дозировка е:

Възрастни и деца над 12 години: 1 таблетка (10 mg) един път дневно.

Деца от 6 до 12 години: половин таблетка (5 mg) два пъти дневно или 1 таблетка (10 mg) веднъж дневно.

Лекарственият продукт не се препоръчва за употреба при деца под 1 години.

При пациенти с чернодробни или чернодробни и бъбречни увреждания дозата трябва да бъде определена от лекар.

Дозирането не се променя при възрастни пациенти и при пациенти само с чернодробни увреждания.

Не превишавайте препоръчаната доза.

Ако симптомите на алергия продължат повече от 1 седмица, консултирайте се с лекар как да продължите.

Ако вземете по-голямо количество от ЗОДАК от необходимото:

Сънливостта може да е главния симптом на предозирането (повече от 5 таблетки като 1 доза). При деца обаче, при предозиране на продукта могат да се появят раздразнителност и възбуда. В случай на предозиране (особено при деца) незабавно потърсете медицинска помощ.

Ако забравите да вземете ЗОДАК

Ако случайно сте пропуснали една доза, вземете я веднага след като сте си спомнили за това. Ако времето за следващата доза е наблизило, не удвоявайте дозата и продължете съгласно първоначалната схема.

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Като всички лекарства ЗОДАК може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки страда от тях.

Рядко могат да се появят леки и преходни нежелани ефекти като главоболие, умора, замаяност, сънливост (сомнолентност), раздразнителност, сухота в устата, храносмилателни разстройства (болка в епигастрита, гадене). Консултирайте се с

лекар, ако забележите някое от описаните състояния или някакви други необичайни реакции. Рядко може да се прояви свръхчувствителност към лекарствения продукт (копривна треска, оток на меките тъкани, затруднено дишане). В този случай трябва незабавно да прекратите приема на този лекарствен продукт и да се консултирате с лекар.

Ако забележите някакви нежелани реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка, моля информирайте за това Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК СЕ СЪХРАНЯВА ЗОДАК

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се използва ЗОДАК след изтичане срока на годност, посочен на опаковката. Срокът на годност изтича на последния ден от месеца посочен на опаковката.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Лекарствения продукт не трябва да се изхвърля в отходните места или с домашните отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да унищожите лекарствения продукт ако няма да го използвате повече. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ЗОДАК

- Активната съставка е цетиризинов дихидрохлорид 10 mg в 1 филмирана таблетка.
- Помощни вещества: лактозаmonoхидрат, царевично нишесте, повидон 30, магнезиев стеарат, хипромелоза 2910/5, макрогол 600, талк, титанов диоксид, емулсия симетикон SE 4.

Как изглежда ЗОДАК и съдържание на опаковката

Бели до почти бели продълговати филмирани таблетки с делителна черта.

Една опаковка съдържа 10 филмирани таблетки.

Възможно е не всички видове да са на пазара.


Притежател на Разрешението за употреба

Зентива АД

У Кабеловни 130

102 37 Прага 10,

Чешка Република



Дата на последна редакция на листовката:

Адрес за контакти

ЗЕНТИВА БГ ЕООД

бул. "Н. Вапцаров" № 25, 1407 София

тел. 962 41 91, 961 41 40

