

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 28.03.2005

## Bekunis Herbal Tablets / Бекунис Хербал таблетки

### Състав

Една стомашно устойчива таблетка съдържа:

**Лекарствени вещества:** Sennae fructicis extractum siccum 150-220mg  
(стандартизиран като хидроксиантраценови гликозиди, изчислени като Sennoside B 20 mg)

**Помощни вещества:** Лактоза, захароза, талк, микрокристална целулоза, метилакрилова киселина – етилов естер на акриловата киселина, калциев карбонат, метилиран силиконов диоксид, титанов диоксид Е 171, желатин, магнезиев стеарат, арабска гума, глюкоза сироп, Макрогол 6000, Полисорбат 80, стеаринова киселина, воськ, натриева сол, кармелоза.

### Лекарствена форма и съдържание

Оригиналната опаковка съдържа 30 стомашно устойчиви таблетки.

### Действие

Растителен лекарствен продукт с лаксативно действие.

### Производител и притежател на разрешението за употреба

roha arzneimittel GmbH  
Rockwinkeler Heerstrasse 100  
D-28355 Bremen  
Germany

### Показания

За непродължителна употреба при констипация (запек).

### Противопоказания

Bekunis Herbal Tablets не трябва да се употребява при свръхчувствителност към лекарственото или към някое от помощните вещества; в случаи на язвена непроходимост (илеус), остри възпалителни заболявания на червата, напр. болестта на Crohn, улцерозен колит и апендицит, стомашни болки с неизвестен произход;



при случаи на тежка дехидратация с нарушение във водно-електролитния баланс;  
при хронична констипация ; при деца на възраст под 12 години

### **Лекарствени взаимодействия**

В случай на хронична употреба или злоупотреба, е възможно засилване на ефекта на сърдечните гликозиди, както и повлияване на действието на антиаритмичните лекарства, поради загуба на калий. Загубата на калий също така може да се увеличи и при едновременното приложение с тиазидни диуретици, кортикоステроиди и Radix Liquiritiae (сладък корен).

### **Специални предупреждения за употреба**

Bekunis Herbal Tablets не трябва да се употребява повече от 1-2 седмици , без консултация с лекар.

Продължителната употреба може да обостри констипацията.

При пациенти с инконтиненция трябва да се избягва продължителен контакт между кожата и изпражненията, като често се сменя пелената или памперсите.

В случай,че симптомите продължат или състоянието се влоши, пациентът трябва да се обърне към лекар

.Една оригинална опаковка Bekunis Herbal Tablets съдържа 119,4 mg глюкоза.  
Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза (1 табл.) набавя до 3,98 mg. Глюкоза.

### **Бременност и кърмене**

През първите три месеца на бременността, Bekunis Herbal Tablets трябва да се употребява само, ако констипацията на може да бъде преодоляна чрез промяна в начина на хранене.

Малки количества от разградните продукти на сената, които притежават лаксативен ефект напр. реин преминават в майчиното мляко. Не е наблюдаван лаксативен ефект при кърмачетата.

### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма данни за промяна в способността за шофиране и работа с машини.

### **Начин на отпускане**

Без лекарско предписание.



## **Дозировка, начин на прием и продължителност на употреба**

### **Дозировка**

1-2 таблетки дневно

### **Начин на употреба**

Таблетките трябва да се поглъщат цели с малко количество течност (вода) вечер преди лягане.

### **Продължителност на употреба**

Bekunis Herbal Tablets не трябва да се употребява повече от 1-2 седмици, без консултация с лекар.

### **Предозиране и други грешки при употреба**

Острата интоксикация с перорални лаксативни лекарства се характеризира най-вече с тежка диария; в някои случаи придружена с тежко чревно раздразнение, което може да бъде съпроводено със сериозна водно-електролитна загуба. Това може да доведе до хипокалиемия (загуба на калий) и болезнени мускулни спазми. Ако коликите и повишенното газообразуване са първоначално преобладаващите симптоми, при определени обстоятелства клиничната картина може да наподобява тази на остръ хирургически корем. Хроничната злоупотреба с лаксативни лекарства се характеризира преди всичко с хипокалиемия (загуба на калий) и често с мускулна отпадналост.

**Първична медицинска помощ:** Възстановяване на водно-електролитния баланс.

**Ако пропуснете един прием, не се притеснявайте!**

**Вземете следващата доза в определеното време. Не дублирайте дозата!**

### **Нежелани лекарствени реакции**

В отделни случаи могат да възникнат спазматични стомашно-чревни разстройства. Възможна е появата на свръхчувствителност, проявяваща се с кожни реакции. При тези обстоятелства е необходимо дозата да се понижки. В случай на хронична употреба или злоупотреба е възможна повищена загуба на вода и соли, особено на калиеви соли. Освен това е възможна появата на албуминурия и хематурия, както и пигментация на чревната мукоза (pseudomelanismus coli), която е безвредна и



обикновено изчезва след прекратяване на лечението. Загубата на калий може да доведе до смущения в сърдечната функция и до мускулна слабост, особено в случаи на едновременно приложение със сърдечни гликозиди, тиазидни диуретици и кортикоステроиди.

Ако забележите някои други нежелани лекарствени реакции, неописани в указанията за употреба, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

**Срок на годност : 3 години**

**Срок на годност, след отваряне на първичната опаковка : 6 месеца**

**Не използвайте лекарството след датата на изтичане срока на годност, посочена от производителя върху опаковката!**

**Да се съхранява при температура под 25<sup>0</sup> С !**

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца!**

**Дата на последна редакция на листовката**

Май 2004

