

Какво трябва да знаете за Цеклор супенсия

Моля, прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да взимате Вашето лекарство. Тя не съдържа цялата информация за Вашето лекарство, която може би е необходимо да знаете, затова, ако имате някакви въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт. Листовката се отнася само за супенсията Цеклор.

Какво съдържа Вашето лекарство?

Вашето лекарство се нарича Цеклор. Неговата активна субстанция е cefaclor (цефаклор).

Супенсията Цеклор се доставя в 60, 75 или 100 миллилитрови (ml) шишета и е розова на цвят с вкус на ягоди. Концентрацията на медикамента в шишетата е 125 милиграма (mg).

В 5ml от супенсията се съдържа 125mg цефаклор. Тя съдържа още неактивните съставки царевично нишесте, диметикон, ксантанова гума, скроза, метил целулоза и придаващ вкуса на ягода агент.

Цеклор е антибиотик. Антибиотиците помагат на организма да се пребори с инфекцията. Цеклор действа чрез разрушаване на дадения микроорганизъм, причинител на инфекцията.

Цеклор се произвежда от Eli Lilly S.p.A., Via Gramci, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.

Защо Цеклор?

Цеклор се използва за лечение на инфекции на ушите, носа и гърлото; бронхити и пневмония; цистит и бъбречни инфекции; кожни инфекции като цирей и инфицирани рани.

Преди да се лекувате с Цеклор

Трябва да сте сигурни, че това лекарство е безопасно за Вас или Вашето дете. Да не се дава Цеклор на бебета под един месец.

Ако отговорите с ДА на някой от следващите въпроси или не сте сигурни, кажете на Вашия лекар или фармацевт.

- Имали ли сте някога алергична реакция към антибиотици като пеницилин или цефалоспорини или към друг тип медикament? (Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, оток или затруднено дишане)
- Имали ли сте някога колит (вид тежка диария)?
- Имате ли проблеми с бъбреците или сте на диализа?
- Вземате ли някакво друго лекарство?
- Бременна ли сте или бихте ли могли да сте?

- Кърмите ли?
- Диабетик ли сте? *Цеклор* може да взаимодейства с някои тестове за захар в урината.
- Вземате ли някакви други лекарства особено варфарин? Рядко, *Цеклор* може да засили ефекта на варфарин.

Ако Вашият лекар иска да Ви направи изследване на кръвта, кажете му първо, че взимате това лекарство.

Как се прилага *Цеклор*

Следвайте инструкциите на Вашия лекар.

Обичайни дози :

Възрастни : по една 5ml чаена лъжиичка (250mg) три пъти дневно.

Деца: Дозата зависи от теглото на детето. Обичайната доза е 20mg/kg/телесно тегло разделена на отделни приема през 8 часа.

Ако не сте сигурен/на какво количество от суспенсията да взимате, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Хубаво разкларате шишето с разтвора преди употреба.
- Трябва да взимате лекарството толкова дълго, колкото Ви е казал Вашия лекар. Обикновено периода е за 7 до 14 дни. Не спирайте да го взимате, когато се почувствате добре, защото след това може да се почувствате по-зле.
- Ако сте пропуснали да вземете необходимата доза, то я вземете веднага щом можете. Ако обаче сте пропуснали няколко приема, уведомете Вашия лекар.
- Не взимайте повече от лекарството, отколкото Ви е казал Вашия лекар. Ако сте взели повече отколкото трябва, кажете веднага на Вашия лекар.

Докато се лекувате с *Цеклор*

- *Цеклор* може да предизвика странични реакции като диария (която може да бъде с кръв или слуз в изпражненията), гадене или повръщане, вагинални смущения или сърбеж, световъртеж или проблеми със съня. В редки случаи детето може да стане хиперактивно по време на лечението с *Цеклор*. Кажете на Вашия лекар ако забележите някоя от тези странични реакции и това Ви притеснява.
- Ако Вашата кожа започне да Ви сърби или да се зачервява или подува, или имате ставни болки, главоболие, внезапно затруднено дишане, спрете приемането на лекарството и уведомете веднага Вашия лекар.
- При няколко пациента е била наблюдавана обърканост, нервност, сънливост или халюцинации. Рядко, изследванията са показвали преходни промени във функцията на черния дроб и бъбреците.

Ако имате някоя от изброените странични реакции, кажете на Вашия лекар.
Той/ тя има повече информация за Цеклор и ще Ви каже какво да правите.

Как да съхранявате Вашето лекарство

Да не се взима Цеклор след срока на годност отбелаязан върху опаковката.
Съхранявайте суспенсията Цеклор в хладилник (2°C – 8°C) и с добре
затворено шише. Изхвърлете лекарството след 14 ден.
Пазете лекарството далече от достъпа на деца.

Запомнете: Това лекарство е за Вас. Може да бъде предписано само от
лекар. Никога не го давайте на други. То може да им навреди, дори
симптомите при тях да са същите като Вашите.

Дата на изготвяне на листовката: Юли 1999г.