

Какво трябва да знаете за Цеклор капсули

Моля, прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да взимате Вашето лекарство. Тя не съдържа цялата информация за Вашето лекарство, която може би е необходимо да знаете, затова, ако имате някакви въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт. Листовката се отнася само за капсулите Цеклор.

Какво съдържа Вашето лекарство?

Вашето лекарство се нарича Цеклор. Неговата активна субстанция е cefaclor (цефаклор).

Всяка капсула съдържа 250 милиграма (mg). Капсулите са в мораво и бяло и са с печат Lilly 3061. Те са в блистери по 12 или 15 капсули. Капсулите съдържат още неактивните съставки царевично нишесте, диметикон и магнезиев стеарат.

Цеклор е антибиотик. Антибиотиците помагат на организма да се преори с инфекцията. Цеклор действа чрез разрушаване на дадения микроорганизъм, причинител на инфекцията.

Цеклор се произвежда от Eli Lilly S.p.A., Via Gramci, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.

Защо Цеклор?

Цеклор се използва за лечение на инфекции на ушите, носа и гърлото, бронхити и пневмония, цистит и бъбречни инфекции, и кожни инфекции като цирей и инфицирани рани.

Преди да се лекувате с Цеклор

Трябва да сте сигурни, че това лекарство е безопасно за Вас. Ако отговорите с ДА на някой от следващите въпроси или не сте сигурни, кажете на Вашия лекар или фармацевт.

- Имали ли сте някога алергична реакция към антибиотици като пеницилин или цефалоспорини или към друг тип медикамент? (Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, оток или затруднено дишане)
- Имали ли сте някога колит (вид тежка диария)?
- Имате ли проблеми с бъбреците или сте на диализа?
- Вземате ли някакво друго лекарство?
- Бременна ли сте или бихте ли могли да сте?
- Кърмите ли?
- Диабетик ли сте? Цеклор може да взаимодейства с някои тестове за захар в урината.

- Вземате ли някакви други лекарства особено варфарин? Рядко, *Цеклор* може да засили ефекта на варфарин.

Ако Вашият лекар иска да Ви направи изследване на кръвта, кажете му първо, че взимате това лекарство.

Как се прилага *Цеклор*

Следвайте инструкциите на Вашия лекар.

Обичайни дози :

Възрастни : 250 милиграмма на всеки три часа. Вашият лекар ще Ви каже дали е необходима по-висока доза.

Деца: Обикновено при деца се препоръчва използването на супенсията *Цеклор*.

Ако не сте сигурен/на колко капсули да взимате, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Глътнете капсулите с вода
- Трябва да взимате лекарството толкова дълго колкото Ви е казал Вашия лекар. Обикновено периода е за 7 до 14 дни. Не спирайте да ги взимате, когато се почувствате добре, защото след това може да се почувствате по-зле.
- Ако сте пропуснали да вземете капсулата, то я вземете веднага щом можете. Ако обаче сте пропуснали няколко приема, уведомете Вашия лекар.
- Не взимайте повече капсули отколкото Ви е казал Вашия лекар. Ако сте взели повече отколкото трябва, кажете веднага на Вашия лекар.

Докато се лекувате с *Цеклор*

- Капсулите могат да предизвикват странични реакции като диария (която може да бъде с кръв или слуз в изпражненията), гадене или повръщане, вагинални смущения или сърбеж, световъртеж или проблеми със съня. В редки случаи детето може да стане хиперактивно по време на лечението с *Цеклор*. Кажете на Вашия лекар ако забележите някоя от тези странични реакции и това Ви притеснява.
- Ако Вашата кожа започне да Ви сърби или да се зачервява, или подува, или имате ставни болки, главоболие, внезапно затруднено дишане, спрете взимането на капсулите и уведомете веднага Вашия лекар.
- При няколко пациента е била наблюдавана обърканост, нервност, сънливост или халюцинации. Рядко, изследванията са показвали преходни промени във функцията на черния дроб и бъбреците.

Ако имате някоя от изброените странични реакции, кажете на Вашия лекар. Той/ тя има повече информация за *Цеклор* и ще Ви каже какво да правите.

Как да съхранявате Вашето лекарство

Да не се взимат капсулите Цеклор след срока на годност отбелязан върху опаковката.

Съхранявайте капсулите под 25°C на тъмно място и далеч от достъп на деца.

Запомнете: Това лекарство е за Вас. Може да бъде предписано само от лекар. Никога не го давайте на други. То може да им навреди, дори симптомите при тях да са същите като Вашите.

Дата на изготвяне на листовката: Октомври 1999г.