

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 24. 06. 02

Информация за пациента

Уважаеми пациенти,
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

Наименование на лекарствения продукт
Cefatox® - Цефатокс

Състав

1 таблетка съдържа:

Лекарствено вещество: Echinaceae purpureae pressed juice (сух пресован сок от Ехинацея) 350 mg.

Помощни вещества: малтодекстрин, безводна лимонена киселина, натриев хидроген карбонат, безводен натриев карбонат, натриев цитрат, манитол, аспартам, калиев ацесулфам, диметикон, лактозаmonoхидрат, сорбитол, безводен натриев сулфат, натриев стеарил фумарат, лимонов аромат.

Какво представлява Цефатокс?

Фитомедикамент.

Таблетки ефервесцентни за перорално приложение – туба с 10, 20 или 40 таблетки.

За какво се използва Цефатокс?

Цефатокс се използва като помощно средство за профилактика и лечение на рецидивиращи инфекции на горни дихателни пътища.

Кога не трябва да взимате или да използвате Цефатокс?

Не се препоръчва употребата на продукта в случаи на свръхчувствителност към някоя от съставките, както и при прогресиращи системни заболявания като туберкулоза, левкози, колагенози, множествена склероза, СПИН, HIV инфекции и други автоимунопатии.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Цефатокс?

При липса на ефект или при влошаване на състоянието посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Цефатокс или могат да бъдат повлияни?

Няма взаимодействия с други лекарства или с храни.

Специални предупреждения

Цефатокс не трябва да се приема от пациенти, които страдат от фенилкетонурия, тъй като съдържа подсладител аспартам, който се превръща при метаболизма във фенилаланин. Една ефервесцентна таблетка Цефатокс съдържа 5 mg аспартам, съответен на 2.8 mg фенилаланин.

Поради недостатъчно проучване приложението на този продукт по време на бременност и кърмене, не се препоръчва употребата му през този период. Цефатокс не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

Как можете да използвате Цефатокс?

Ако не е предписано друго, възрастни и деца над 12 години приемат по 1-2 ефервесцентни таблетки дневно; деца от 4 до 12 години приемат по 1 таблетка дневно, разтворена във вода.

Продължителността на лечението е не повече от 8 седмици.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Цефатокс?

Няма съобщени случаи на предозиране.

Какво трябва да правите, ако сте пропуснали прием на Цефатокс или преждевременно прекратите лечението?

Ако сте пропуснали прием, продължете както обикновено. Не приемайте двойна доза от лекарството, за да компенсирате пропуснатия прием.

Липсва нежелан ефект при спиране на лечението с Цефатокс.

Какви нежелани реакции може да предизвика Цефатокс?

В редки случаи може да настъпят реакции на свръхчувствителност. При продукти с Ехинацея са наблюдавани обрив, сърбеж, рядко оток на лицето, затруднено дишане, замайване и намаляване на кръвното налягането.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съхраняване на Цефатокс.

Не се изискват специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 3 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

D-87437 Kempten, Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

Бул. "Джеймс Баучер" 114 А

1407 София

Дата на последна редакция на листовката

Юни 2002